



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE BIOANÁLISIS

CARACTERIZACIÓN DE *Artemisia annua* CULTIVADA BAJO CONDICIONES
AMBIENTALES TÍPICAS DEL NORESTE VENEZOLANO Y EVALUACIÓN DE SU
ACCIÓN SOBRE EPIMASTIGOTES DE *Trypanosoma cruzi*
(Modalidad: Tesis de Grado)


YUSMARIS JOSEFINA CARIACO SIFONTES

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADO EN BIOANÁLISIS


CUMANÁ, 2013

CARACTERIZACIÓN DE *Artemisia annua* CULTIVADA BAJO CONDICIONES
AMBIENTALES TÍPICAS DEL NORESTE VENEZOLANO Y EVALUACIÓN DE SU
ACCIÓN SOBRE EPIMASTIGOTES DE *Trypanosoma cruzi*


APROBADO POR:




Prof. Mariólgia Berrizbeitia
Asesora



Prof. José Imery
Coasesor



Prof. Zulay Simoni



Prof. José Veliz

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	I
AGRADECIMIENTOS.....	II
LISTA DE TABLAS.....	III
LISTA DE FIGURAS.....	IV
RESUMEN.....	VI
INTRODUCCIÓN.....	1
METODOLOGÍA.....	8
Obtención de las semillas de <i>A. annua</i>	8
Determinación de la calidad de las semillas.....	8
Definición del área y condiciones ambientales de cultivo.....	9
Cultivo de <i>A. annua</i> bajo condiciones de vivero.....	9
Caracterización de atributos morfológicos de <i>A. annua</i>	10
Cosecha y secado y macerado de material foliar.....	11
Obtención de los aislados de <i>T. cruzi</i>	12
Producción de los cultivos axénicos de la forma epimastigotes de <i>T. cruzi</i> , aislados RG1 y CHHP.....	12
Preparación de la infusión de <i>A. annua</i>	12
Determinación de las concentraciones efectivas de infusión de <i>A. annua</i> sobre epimastigotes de <i>T. cruzi</i>	13
Análisis estadístico.....	15
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	17
CONCLUSIONES.....	40
RECOMENDACIONES.....	42
BIBLIOGRAFÍA.....	43
APÉNDICES.....	51
HOJAS DE METADATOS.....	57

DEDICATORIA

A

Dios, por ofrecerme grandes oportunidades y difíciles momentos de los cuales aprender, así como por poner en mi camino a excelentes personas que me han ayudado a forjar quien soy hoy.

Mis padres Leyda Sifontes y Antonio Cariaco, por levantar a una familia teniendo limitados recursos, este logro es suyo.

Mis hermanos Eduardo, Yilmarys y Antonio, por todo su cariño, los quiero.

Mis amigas María Alejandra, Mairelis, Rafela, Adriana y Dayana compañeras, cómplices y confidentes, las adoro chicas.

Mi novio Jesús, mi amor y mi mejor amigo, te amo.

Mis asesores Mariolga Berrizbeitia y José Imery, por fomentar en mí el razonamiento, la curiosidad científica y la búsqueda incesante de conocimiento, los admiro.

Mi abuela Juana, nunca vi a una planta marchitar bajo tu cuidado, ahora espero estés en los jardines de Dios, te extraño.

AGRADECIMIENTOS

A

La Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, la casa más alta.

Los profesores Mariolga Berrizbeitia y José Imery por su amistad y consejos acerca de la vida, por invertir su tiempo en mi trabajo, por su constante aporte de conocimientos y ayuda, sin los cuales habría sido imposible la culminación de este trabajo. Así mismo, les agradezco al señor Ricardo Morgado y la señora Wendy Ozols por su cortesía y comprensión.

El Postgrado de Biología Aplicada, y muy especialmente a la Lcda. Dairene Moreno, Lcda. Mayelis González, Sra. Luz Coronado, MSc. Jessica Rodríguez, MSc. Noris García, infinitas gracias por su ayuda y amistad.

La MSc. Zulay Simoni, por su disposición y colaboración.

La profesora Carmen Alfonsi por su colaboración en el análisis estadístico.

El personal del Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero, por su colaboración.

El Dr. Pierre Lutgen, por haber facilitado las semillas y hojas de *A. annua*, sin este valioso aporte este trabajo no habría podido llevarse a cabo.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Pruebas de calidad realizadas a las semillas de <i>Artemisia annua</i>	17
Tabla 2. Porcentajes de inhibición del crecimiento de los aislados de <i>Trypanosoma cruzi</i> (CHHP y RG1) a las diferentes concentraciones de la infusión de <i>Artemisia annua</i> a 7 días de exposición.....	33
Tabla 3. Análisis de varianza multifactorial para la densidad celular de epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> , bajo acción de las infusiones de <i>Artemisia annua</i>	35

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Semillas de *Artemisia annua* durante el proceso de germinación *in vitro* sobre papel de filtro. A: aparición de la radícula (r) del embrión; B: elongación del hipocótilo (h) y C: salida de los cotiledones (c) para formar las hojas cotiledóneas. Las figuras B y C son fotografías de la misma plántula tomada desde enfoques distintos.....18
- Figura 2. Histograma de frecuencias del número de plántulas nuevas de *Artemisia annua* por día, en base a la siembra de 10 000 semillas en arena.....19
- Figura 3. Desarrollo de *Artemisia annua* durante el ensayo de germinación en arena. A: planta con desarrollo de brotes florales prematuros a los 34 días post-siembra; B: planta con brotes florales luego del trasplante; C: plántulas trasplantadas. Flechas: botones florales.....20
- Figura 4. Semillas de *Artemisia annua* junto a restos de flores, hojas y materia vegetal secos provenientes de Luxemburgo. Flechas: semillas.....22
- Figura 5. Plantas de *Artemisia annua* en etapa de germinación y desarrollo foliar. A: plántulas en etapa de germinación, nótese las hojas cotiledóneas (c) y las hojas verdaderas (v); B: Planta en etapa de desarrollo foliar, donde se aprecia la aparición de las primeras hojas verdaderas en par (1°) y de las siguientes de manera solitaria y alterna (2°, 3°, 4°, 5° y 6°).....23
- Figura 6. Longitudes de los folíolos principales en la hoja de *Artemisia annua* en la novena semana de crecimiento, al final de la etapa de ramificación.....24
- Figura 7. Plantas de *Artemisia annua* en etapa de brote floral y de floración. A: brotes foliares junto a hojas bandera. B: inflorescencias.....26
- Figura 8. Aquenios de *Artemisia annua* en desarrollo.....26
- Figura 9. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1).....27
- Figura 10. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1) a 7 días post-tratamiento.....28
- Figura 11. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Luxemburgo a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1)....29
- Figura 12. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua*

cultivada en Luxemburgo, sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> (aislado RG1) a 7 días post-tratamiento.....	29
Figura 13. Actividad de la infusión de <i>Artemisia annua</i> cultivada en Cumaná a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> (aislado CHHP).....	30
Figura 14. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de <i>Artemisia annua</i> cultivada en Cumaná, sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> (aislado CHHP) a 7 días post-tratamiento.....	31
Figura 15. Actividad de la infusión de <i>Artemisia annua</i> cultivada en Luxemburgo a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> (aislado CHHP).....	32
Figura 16. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de <i>Artemisia annua</i> cultivada en Luxemburgo, sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> (aislado CHHP) a 7 días post-tratamiento.....	32
Figura 17. Cambios morfológicos de los epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i> en cultivos con infusiones de <i>Artemisia annua</i> (400X). Forma fusiforme (A) en medio sin <i>Artemisia annua</i> , forma alargada (B) y forma redondeada (C) en medios con <i>Artemisia annua</i>	34

RESUMEN

En esta investigación se caracterizaron semillas de *Artemisia annua* enviadas desde Luxemburgo, y las plantas que resultaron de su siembra en Cumaná; así mismo, se evaluó la acción de esta planta sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* usando dos tipos de infusiones: una preparada con hojas de plantas cultivadas en Cumaná y otra con hojas provenientes de Luxemburgo, ambas a concentraciones de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00; 3,00% m/v de *A. annua*; sobre dos aislados de *T. cruzi*: RG1 y CHHP, durante 7 días, en cada uno de los cuales se determinó la densidad celular de los parásitos. Las semillas de *A. annua* recibidas poseían un porcentaje de humedad de $9,68 \pm 1,06\%$, germinación *in vitro* de $3,66 \pm 1,53\%$, masa promedio de cada semilla de $42,50 \pm 1,90 \mu\text{g}$ y longitud promedio de $0,84 \pm 0,13 \text{ mm}$; al sembrar en arena su desarrollo fue escaso y la producción de primordios florales prematura (a los 34 días), además no soportaron el proceso de trasplante; en cambio, en tierra abonada se logró un mejor desarrollo; sin embargo, produjeron botones florales a los 28 días posteriores a la siembra. Las plantas bajo estudio tuvieron una altura máxima de 45,00 cm, presentaron hojas primero dentadas, luego bipinatisectas y finalmente tripinatisectas de hasta 13,00 cm de longitud, tallos de hasta 5,00 mm de diámetro, los cuales en la fase temprana de crecimiento son lisos y en la ramificación estriados, e inflorescencias plurifloras, cuyos capítulos presentaron 4,00 mm de altura y 6,00 mm de diámetro aproximadamente. Se encontró que las infusiones de *A. annua* tuvieron un efecto antiproliferativo, dosis dependiente sobre ambos aislados de *T. cruzi*, resultando ser más potente la acción de la infusión preparada con hojas provenientes de Luxemburgo, que la que fue preparada con hojas de plantas cultivadas en Cumaná. Ampliando y profundizando los estudios acerca del tema, éstas infusiones de *A. annua* podría convertirse en una nueva alternativa terapéutica contra la infección contra *T. cruzi*.

INTRODUCCIÓN

Artemisia annua L. es una planta de la familia Asteraceae que ha sido usada en China desde hace más de 2 000 años para el tratamiento de muchas enfermedades, incluyendo las parasitarias. Actualmente, es ampliamente conocida por la actividad antimalárica de sus extractos (Mucciarelli y Maffei, 2002).

El primer registro de las propiedades benéficas de esta planta, conocida en China como Qing Hao, datan del año 168 A.C, en un reporte titulado: “Recetas para 52 clases de enfermedades”, en el cual se describe como medicina para el tratamiento de las hemorroides; y la primera sugerencia de sus propiedades antimaláricas se encontraron en un documento de Ge Hong (281–340 D.C.), donde se describe la forma de preparación del tratamiento para la fiebre causada por malaria, tomando un puñado de la planta y empapándolo en dos litros de agua, para luego colar el líquido y beberlo en su totalidad. En la década de 1960 ocurrió la rápida expansión de parásitos maláricos multiresistentes, llevando a la creación del Programa 523, en el cual científicos chinos experimentaron con muestras de plantas tradicionales de ese país; hasta que a principios de la década de 1970 se llevó a cabo el aislamiento y caracterización del compuesto activo de *A. annua* (Li *et al.*, 2006). El compuesto activo de la planta es la artemisinina, la caracterización de sus efectos fueron iniciados por científicos chinos, convirtiendo estos estudios en valiosos avances en el control de diversas enfermedades, en especial de la malaria (Klayman, 1985).

A. annua está ampliamente distribuida en zonas templadas y subtropicales del mundo, conjuntamente, se han iniciado cultivos experimentales en muchos países en los cuales esta planta no es nativa. Siendo originaria de China, crece principalmente en Asia y Europa; no obstante, también lo hace en la región mediterránea, países de África del Norte, Canadá y Estados Unidos (Ferreira *et al.*, 1997; Organización Mundial de la Salud, 2006a). En Latinoamérica, se sabe que se desarrolla en Argentina, Brasil y Colombia (Spegazzini y Najera, 1989; De Magalhães *et al.*, 2006). En Venezuela, son

pocos los trabajos encontrados que describan el cultivo de esta planta; sin embargo, Vivas (1997) logró el desarrollo de ésta en San Antonio de los Altos, estado Miranda, bajo condiciones de umbráculo.

La planta presenta una alta adaptabilidad, con proclividad por las condiciones solares, bajo esta circunstancia produce una mayor cantidad de compuestos activos y aceites esenciales, que cuando se desarrolla en la sombra (Acosta *et al.*, 2011). La temperatura para la germinación de las semillas está por encima de 7°C, mientras que para su crecimiento se requieren temperaturas que oscilan entre 20 y 25°C y suelos con pH entre 4,50 y 8,50; en cuanto a la altitud a la cual se desarrolla, ésta varía dependiendo del país (Ferreira *et al.*, 1995; Organización Mundial de la Salud, 2006a).

A. annua es una hierba anual, de días cortos con un fotoperíodo de aproximadamente 13,50 horas, erecta, con una altura que puede variar entre 0,50 y 2,00 m, aunque se han encontrado más pequeñas. Las hojas son aromáticas con rangos entre 2,50 y 5,00 cm de longitud, bipinatisectas o tripinatisectas; presenta inflorescencias en capítulos dispuestos en amplias panojas, con brácteas orbiculares formando el involucre; estas pequeñas flores amarillas pueden ser de dos tipos: las periféricas pistiladas (femeninas) y las del disco hermafroditas (bisexuales), con ovarios uniloculares que generan aquenios glabros, ligeramente nervados; *A. annua* se propaga a través de semillas y su polinización se lleva a cabo a través del viento o insectos. Su ciclo de crecimiento, desde la siembra hasta la senescencia consiste en seis etapas, llamadas fases de germinación y desarrollo foliar, ramificación, brote floral, floración, fructificación y muerte de la planta. La duración de cada período de crecimiento de *A. annua* varía con la fuente de las semillas, técnicas, lugar y condiciones de cultivo (Spegazzini y Najera, 1989; Ferreira *et al.*, 1995; Ferreira y Janick, 1996; Organización Mundial de la Salud, 2006a).

El componente activo de los extractos de *A. annua* es la artemisinina, una lactona sesquiterpenoide que traspasa las membranas biológicas con facilidad. Además de este compuesto, la planta es rica en esteroides, cumarinas, purinas, terpenoides y flavonoides,

de los cuales los sesquiterpenoides ácido dihidroartemisínico, ácido artemisínico, arteéter, artemether y artesunato son los más importantes, encontrándose éstos en las hojas y en menor cantidad en inflorescencias de la planta (Luo y Shen, 1987). En cuanto a la cosecha de *A. annua*, Woerdenbag *et al.*, (1994) aseguran que se debe llevar a cabo antes de la floración (durante los 4 a 6 meses posteriores a la siembra), pues justo antes de ésta el contenido de aceites esenciales y artemisinina alcanza su máximo. El contenido de artemisinina de *A. annua* silvestre ha sido descrito variando desde 0,01% hasta 1,00%, dependiendo de la fuente y condiciones de cultivo de la planta (Trigg, 1989; Delabays *et al.*, 1993).

El mecanismo de acción antiparasitario de la artemisinina, que se conoce actualmente es el que ésta ejerce sobre especies de *Plasmodium*, el cual implica dos etapas: una de activación, en la cual el hierro contenido dentro del parásito, producto de la degradación de la hemoglobina, cataliza la degradación del puente endoperóxido de la artemisinina, produciendo radicales libres altamente reactivos; y una de alquilación, en la que los radicales libres generados en la activación forman un enlace entre la artemisinina y las proteínas parasitarias o con la hemozoína (pigmento parasitario), causando daños en la membrana, reducción de la actividad citocromo-oxidasa y de la síntesis protéica del parásito, llevando a la muerte del mismo (Meshnick, 1994; Wright y Warhurst, 2002).

Recientemente, debido a la necesidad de aumentar la producción de artemisinina, se identificaron en el mapa genético de la planta las regiones del genoma que afectan componentes relacionados con el rendimiento de la artemisinina, como son la arquitectura de la planta, el área de las hojas, cantidad de tricomas por área de hoja, entre otros (Graham *et al.*, 2010). La concentración de artemisinina y otros compuestos producidos por la planta se ve afectada por la nutrición del sustrato donde se desarrollan las mismas, siendo de vital importancia la fertilización con nitrógeno, potasio y fósforo principalmente; así como también por la temperatura a la cual se propagan las plantas, a este respecto Ferreira *et al.* (1995) afirman que las altas temperaturas ambientales provocan una disminución en las concentraciones de artemisinina (Ferreira, 2007;

Davies *et al.*, 2009).

Los componentes químicos de *A. annua* pueden extraerse de diferentes maneras, entre ellas se encuentran la preparación de infusiones y la extracción con solventes orgánicos como éter de petróleo, cloroformo y hexano, pudiendo obtenerse a través de este procedimiento 95,00 a 98,00% de la artemisinina y sus precursores; sin embargo, el método más usado actualmente para la extracción total de artemisinina es la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) (Räth *et al.*, 2004; Ferreira, 2007).

La Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de terapias basadas en la combinación de derivados de la artemisinina con otros medicamentos antimaláricos como lumefantrina, amodiaquina, mefloquina y sulfadoxina-pirimetamina, sumado a esto, algunos autores defienden el uso de las terapias basadas en píldoras de artemisinina o sus derivados, por tratarse de una fuente pura de estos compuestos; por el contrario, otros alegan que la infusión de *A. annua* resulta ser más efectiva debido a la sinergia que presenta la artemisinina con compuestos como los flavonoides y la curcumina presentes en la planta (Arrow *et al.*, 2005; Organización Mundial de la Salud, 2006b; Lutgen, 2009).

Existen algunos estudios que demuestran que las infusiones son más efectivas que las monoterapias, entre estos se encuentra el estudio de Mueller *et al.* (2000), quienes demostraron que la infusión de *A. annua* es efectiva en el tratamiento de la malaria al encontrar que su administración a pacientes diagnosticados con dicha enfermedad, disminuía considerablemente la parasitemia al cuarto día de iniciado el tratamiento; de igual modo, observaron que en otro grupo de pacientes sometidos al tratamiento con la infusión se atenuaban de manera significativa signos y síntomas como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vértigo, artralgia, entre otros; así como también concluyeron en su investigación que la biodisponibilidad de la artemisinina proveniente de infusiones, podía exceder la de las tabletas de artemisinina pura. Posteriormente, Räth *et al.* (2004) determinaron que la artemisinina derivada de la infusión de *A. annua* se absorbía

rápidamente, observando la concentración plasmática máxima a los 30 minutos después de la administración; en contraste, la concentración máxima de artemisinina en el plasma, luego de ingerir tabletas de este compuesto ocurre aproximadamente a las 3,00 horas (Organización Mundial de la Salud, 2006b).

Muchos de los compuestos extraídos de *A. annua* tienen propiedades antimaláricas, siendo la artemisinina la más activa; por ello, es posible que la mezcla de constituyentes encontrados en la infusión intervenga para que la producción de resistencia a estos compuestos sea menos probable, en comparación con la monoterapia representada por un simple agente encontrado en los derivados químicos de la artemisinina (Krishna *et al.*, 2004; Biesen, 2010). Entre estos constituyentes con actividad antimalárica se encuentra el arteéter, el cual es un derivado de la artemisinina que combinado con la curcumina aumentó considerablemente el número de días de supervivencia de ratones infectados con *Plasmodium berghei* en comparación con el compuesto puro (Nandakumar *et al.*, 2006).

Wright *et al.* (2010) compararon la concentración de artemisinina extraída a través de métodos antiguos chinos como el remojo y el machacamiento de hojas frescas, con la preparación de infusiones de hierba seca proveniente de *A. annua*; encontrando que los métodos antiguos eran más eficaces en la producción de extractos ricos en artemisinina; y Restrepo *et al.* (2011) estudiaron la utilidad de *A. annua* como tratamiento de la leishmaniasis, sin encontrar efectos de la infusión *in vitro*, aunque encontraron efectividad con las fracciones purificadas de la planta.

Los estudios científicos acerca de esta planta se han centrado, mayormente, en la lucha contra la malaria a nivel mundial, siendo probado su potente efecto antimalárico (Arrow *et al.*, 2005; Carmargo *et al.*, 2009). La artemisinina y sus derivados muestran eficacia contra diversos parásitos, para los cuales existen algunas teorías sobre cómo este compuesto actúa sobre ellos, tales son: *Trypanosoma spp.*, inhibiendo la actividad de las bombas ATPasa dependientes de calcio en sus membranas; *Leishmania spp.*, induciendo

apoptosis; *Toxoplasma gondii* y *Schistosoma japonicum* (el mecanismo de acción sobre estos dos últimos aún es desconocido) (Yang y Liew, 1993; Xiao *et al.*, 2001; Li *et al.*, 2006; Mishina *et al.*, 2007; Sen *et al.*, 2007; De Oliveira *et al.*, 2009; Restrepo *et al.*, 2011) . De igual forma, se ha demostrado que los distintos extractos y componentes de *A. annua* poseen actividad antibacterial; provocan efectos antiinflamatorios semejantes al del diclofenac sódico; afectan la viabilidad de células cancerígenas y presentan poder tóxico sobre hierbas monocotiledoneas y dicotiledóneas, demostrando así su poder herbicida (Bagchi *et al.*, 1997; Bhakuni *et al.*, 2001; Li *et al.*, 2006; Lutgen y Michels, 2008; Swapnadeep *et al.*, 2009; Michaelis *et al.*, 2010).

T. cruzi es un protozoo flagelado causante de la enfermedad de Chagas, la cual es endémica en diferentes regiones de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, país donde ésta enfermedad presenta una prevalencia de aproximadamente 8,90% (Feliciangeli, 2009). Esta infección se transmite a través de las deyecciones de triatomíneos, en las cuales se encuentra el agente infectante. El triatomíneo al alimentarse en un mamífero defeca y los parásitos pasan al torrente circulatorio a través de las mucosas o escoriaciones producidas por el rascado. Este parásito, durante su ciclo de vida, puede presentarse bajo la forma de epimastigote en el triatomíneo, amastigote y tripomastigote sanguíneo en los tejidos y la sangre del hombre, respectivamente; siendo la fase de epimastigote y amastigote en la cual *T. cruzi* se multiplica mediante fisión binaria (Hómez *et al.*, 2007).

El tratamiento sintomático contra la tripanosomiasis o infección por *T. cruzi* está restringido principalmente hacia dos drogas de limitada efectividad y alta toxicidad: benznidazol y nifurtimox, produciendo este último más efectos nocivos que el primero. Estos medicamentos tienen una efectividad de hasta 80,00% en pacientes tratados en fase aguda; sin embargo, más del 80,00% de los pacientes tratados en fase crónica no son curados parasitológicamente con dichos compuestos (Rodríguez, 2005). Entre las desventajas de la administración de estos medicamentos se encuentran, su elevado costo, difícil disponibilidad, administración por largos períodos de tiempo (60 días) y las reacciones adversas, entre las que se encuentran: náuseas, anorexia, vómitos, pérdida de

peso, temblores, polineuropatías, eritema, dermatopatías alérgicas, insomnio, linfadenopatías, dolor muscular, depresión de la médula espinal, entre otros (Castro y Díaz, 1988; Stoppani, 1999).

Se ha demostrado la resistencia tanto *in vivo* como *in vitro* de algunas cepas de *T. cruzi* contra nifurtimox y benznidazol (Filardi y Brener, 1987). De este hecho, nace la necesidad de encontrar nuevas herramientas terapéuticas contra la enfermedad, constituyendo las de origen herbal una buena alternativa gracias a su baja toxicidad y eficientes resultados. En este sentido, se ha probado el efecto de lactonas sesquiterpenoides (al igual que la artemisinina) aislados de la misma familia que *A. annua* (Asteraceae) como la dehidrozaluzanina C, aislado de la planta *Munnozia maronii*, que inhibe el crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi in vitro*; y la psilostachina y peruvina extraídos de *Ambrosia tenuifolia*, los cuales mostraron una marcada actividad anti-*T. cruzi* (Fournet *et al.*, 1993; Sülsen *et al.*, 2008).

En los últimos años, los esfuerzos científicos relacionados con *A. annua* se han centrado mayormente en el uso de esta planta como tratamiento contra la malaria, quizás por esta razón existen pocas investigaciones en las que se evalúe la acción de los extractos de esta hierba sobre *T. cruzi*; la más destacada es la de Mishina *et al.* (2007), en la cual se comprobó, mediante ensayos *in vitro*, la inhibición que ejercen la artemisinina y sus derivados purificados, sobre cepas de *T. cruzi* y *T. brucei rhodesiense*.

Debido a las múltiples aplicaciones clínicas presentadas por *A. annua* y al reciente descubrimiento de la sinergia que presenta la artemisinina con otros compuestos presentes en esta prometedora hierba, se llevó a cabo la caracterización morfológica de la planta cultivada en Venezuela y la evaluación de la acción antiparasitaria *in vitro* de su infusión sobre epimastigotes de *T. cruzi*, siendo la presente investigación pionera en este tema en Venezuela.

METODOLOGÍA

Obtención de las semillas de *A. annua*

Las semillas que se utilizaron en esta investigación y las muestras de material foliar de la cosecha luxemburguense, fueron enviadas desde la Organización no Gubernamental “Iwerliewen” de Luxemburgo, por el Dr. Pierre Lutgen.

Determinación de la calidad de las semillas

Determinación del porcentaje de humedad de las semillas

Se pesaron en una balanza analítica 250 semillas, esta masa representó la masa húmeda de las mismas. Seguidamente, estas semillas se llevaron a una estufa a 105°C por 24,00 horas; luego se pesaron nuevamente, obteniendo el valor de su masa seca. Este ensayo se realizó por triplicado y se obtuvo el porcentaje de humedad según la fórmula utilizada por Cordero (2002), la cual se describe a continuación:

$$\text{Porcentaje de humedad} = \frac{\text{masa húmeda} - \text{masa seca}}{\text{masa húmeda}} \times 100$$

Masa de cada semilla

A partir del ensayo anterior se calculó la masa de cada semilla dividiendo su masa húmeda entre el número de éstas (250), de esta manera se estimó la masa promedio de cada semilla.

Determinación del porcentaje de germinación *in vitro* o germinación fisiológica

Se tomaron tres placas de Petri (previamente esterilizadas a 121°C y 15,00 atm, durante 15 minutos) a cada una de las cuales se les colocó un círculo de papel de filtro, sobre el cual se esparcieron de manera uniforme 100 semillas, luego se humedeció el papel periódicamente con agua destilada hasta que las semillas germinaron. Se consideró que las semillas habían germinado cuando apareció la radícula del embrión; entonces, se obtuvo el porcentaje de germinación fisiológica a través de la siguiente fórmula, descrita por Sandoval (2009):

$$\text{Porcentaje de germinación} = \frac{\text{número de semillas germinadas}}{\text{número de semillas iniciales}} \times 100$$

Definición del área y condiciones ambientales de cultivo

El cultivo de *A. annua* se llevó a cabo en un clima típico del noreste de Venezuela, específicamente en un área de bosque muy seco tropical dentro de Cumaná. Esta ciudad se encuentra en las coordenadas 10°27'00" de latitud Norte y 64°10'48" longitud Oeste, a una altitud que va de 0-5 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuenta con temperaturas promedio de 26°C y extremas de 17°C y 35°C; humedad relativa del 76,00%, con extremas que van de 40,00 a 100%; y precipitaciones medias anuales de 375,00 mm, con extremas de 106,00 mm y 852,00 mm (Vila, 1965; Grases *et al.*, 2004).

Cultivo de *A. annua* bajo condiciones de vivero

Germinación en arena

El cultivo se inició sembrando 10 000 semillas en 10 bandejas de fondo agujereado, éstas contenían arena de río (cernida, lavada y esterilizada en una estufa a 105°C durante 30 minutos), con el objeto de probar este sustrato como medio de germinación para *A. annua*. Para ello, se mezclaron grupos de 1 000 semillas con aproximadamente 200,00 cm³ de arena fina, esta mezcla permitió su diseminación uniforme en la superficie de cada una de las bandejas.

Las semillas se sembraron a poca profundidad de la superficie del sustrato, al cual se le extrajo una capa de arena de aproximadamente 1,00 cm de espesor; entonces se le trazaron líneas paralelas, en las cuales deberían emerger las plántulas una vez germinadas. Sobre cada una de estas líneas se depositaron las semillas que fueron mezcladas con arena; luego se cubrieron con el sustrato extraído inicialmente y finalmente se regaron con agua destilada. Estas bandejas fueron regadas cada 2 días y se observó la aparición de signos de germinación agronómica, caracterizada por la aparición de brotes vegetativos en la superficie del sustrato (Díaz, 2002; Kulkarni, 2002; Laskowski y Bautista, 2002; Laughlin *et al.*, 2002).

Germinación en tierra abonada

Se utilizaron cajas de germinación, conteniendo tierra compostada a base de caña de azúcar y tierra rica en humus, a las cuales se les agregaron las semillas de *A. annua* mezcladas con arena fina esparciéndose de manera uniforme en la superficie del germinador, luego se cubrieron con una capa de 1,00 cm de profundidad con el mismo sustrato. Estos germinadores se regaron cada dos días (Laughlin *et al.*, 2002).

Trasplante

Cuando las plantas alcanzaron la firmeza suficiente o unos 10,00 cm de altura aproximadamente se trasplantaron a envases plásticos de 355cm³ de capacidad, agujereados en el fondo; los cuales tenían partes iguales de dos tipos de sustrato: arena fina del mismo tipo donde germinaron las semillas y tierra compostada. Según Liersch *et al.* (1986) este proceso es el mejor método de establecimiento para *A. annua*.

Caracterización de atributos morfológicos de *A. annua*

Las semillas de *A. annua* provenientes de Luxemburgo y las plantas que emergieron a partir de ellas, bajo condiciones de vivero, fueron objeto de una detallada observación en cuanto a su morfología a lo largo del ciclo de vida. Para ello, se evaluaron las siguientes características:

Características de las semillas provenientes de Luxemburgo: forma, color y tamaño; este último fue medido utilizando el software SigmaScan Pro version 5.0.

Etapa de germinación y desarrollo foliar

Días hasta la germinación agronómica: se registró como el número de días, hasta la aparición del primer brote vegetativo en la superficie del sustrato.

Días hasta la aparición del primer par de hojas: se registró como el número de días, hasta la aparición de las hojas que aparecen luego de las cotiledóneas.

Características de las hojas: forma, color y dimensiones.

Características del tallo: diámetro, textura, color y longitud desde el cuello hasta el ápice

de la hoja más alta.

Etapa de ramificación

Características de las hojas: forma, color, olor y dimensiones.

Características del tallo: diámetro, textura, color y longitud desde el cuello hasta el ápice de la hoja más alta.

Etapa de brote floral

Días hasta la floración: se registró como el número de días, hasta la aparición de los primeros brotes florales.

Etapa de floración

Características de las inflorescencias: forma, color y tamaño.

Etapa de fructificación

Características del fruto: formación de aquenios.

Etapa de marchitamiento

Días hasta el marchitamiento: se registró como el número de días, desde la siembra hasta la senescencia de la planta.

Cosecha y secado y macerado de material foliar

La cosecha se realizó cuando las plantas alcanzaron la etapa de brote floral (Ferreira *et al.*, 1995). Las hojas se cortaron desde la base, seguidamente se depositaron en un recipiente agujereado, luego se taparon con una malla y se colocaron en la oscuridad; éstas hojas se movieron diariamente y cuando obtuvieron un secado uniforme se trituraron, el material obtenido se guardó en bolsas herméticas y posteriormente se almacenó a temperatura ambiente en un lugar libre de humedad (Organización Mundial de la Salud, 2006a). Una vez seco y macerado, éste material se empleó para preparar las infusiones que fueron usadas *in vitro* sobre epimastigotes de *T. cruzi*.

Obtención de los aislados de *T. cruzi*

Se utilizaron formas epimastigotes de *T. cruzi* de los aislados RG1 y CHHP; ambos son aislados autóctonos extraídos de heces de triatomíneos infectados en los estados Sucre y Vargas, respectivamente. Estos se mantuvieron mediante pasajes mensuales en cuñas de agar sangre en el Laboratorio de Inmunoparasitología del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente (IIBCA-UDO) y luego adaptadas al medio de cultivo axénico.

Producción de los cultivos axénicos de la forma epimastigotes de *T. cruzi*, aislados RG1 y CHHP

Las formas epimastigotes del *T. cruzi* de los aislados RG1 y CHHP, se cultivaron *in vitro* a 27°C en frascos para cultivo celular, empleando para ello medio de cultivo “Liver Infusion Tryptose” (LIT) (Difco®) (20,00 g), triptosa (5,00 g), NaCl (4,00 g), KCl (0,40 g), Na₂HPO₄ (8,00 g) y dextrosa (2,00 g) en un litro de agua destilada a pH 7,40 esterilizado sólo por filtración utilizando membranas de acetato de celulosa de 0,22 µm (Millipore®) y suplementado con 10,00% de suero fetal bovino, 1,00% de penicilina/estreptomicina y 25,00 mg de hemina disuelta en una mezcla v/v de agua destilada y trietanolamina. La colecta de los parásitos se realizó durante la fase logarítmica de crecimiento exponencial (aproximadamente al séptimo día de cultivo) (Berrizbeitia *et al.*, 2004).

Preparación de la infusión de *A. annua*

Se prepararon dos tipos de infusión: una con hojas secas provenientes de la planta cultivada en Cumaná y otra con hojas secas provenientes de plantas cultivadas en Luxemburgo. Se siguió el protocolo descrito por R ath *et al.* (2004), con algunas modificaciones.

Las infusiones se prepararon para obtener concentraciones de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00 y 3,00% m/v de hojas secas de *A. annua* en medio de cultivo LIT. Para ello se procedió de la siguiente manera: en primer lugar, se pesaron las cantidades de las hojas

maceradas de *A. annua* necesarias para obtener las diferentes concentraciones de la infusión, las cuales se depositaron en envases plásticos de 60 cm³ de capacidad, previamente identificados. Luego se repartieron 20,00 ml del medio en seis vasos de precipitado de 50,00 ml de capacidad, el medio se calentó hasta casi llegar a la ebullición. Después a cada volumen del medio de cultivo LIT caliente se agregó sobre la masa correspondiente de las hojas de la planta. Las infusiones se dejaron reposar por 10 minutos para luego ser filtradas usando un colador de tela, con la finalidad de remover las hojas.

Los medios de cultivo a diferentes concentraciones m/v de *A. annua*, se trasladaron al cuarto de cultivo donde en una campana de flujo laminar bajo condiciones de esterilidad, se esterilizaron por filtración, utilizando filtros de 0,20 µm (Milipore®) unidos a una jeringa. Seguidamente, cada una de estas infusiones en medio LIT, se suplementó con 10,00% de suero fetal bovino, 1,00% de penicilina/estreptomina y 25,00 mg de hemina disuelta en una mezcla v/v de agua destilada y trietanolamina. Una vez preparadas las infusiones se procedió a iniciar los cultivos de *T. cruzi*.

Determinación de las concentraciones efectivas de infusión de *A. annua* sobre epimastigotes de *T. cruzi*

Se utilizaron epimastigotes de *T. cruzi*, mantenidos en fase de crecimiento exponencial a 27°C, en medio LIT. Este experimento se inició ajustando a una densidad celular de 2x10⁶ parásitos/ml en los cultivos a las diferentes concentraciones m/v de la infusión de *A. annua* (0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00 y 3,00%). Los experimentos se realizaron por duplicado para cada aislado con infusiones preparadas con ambas plantas (cultivadas en Cumaná y cultivadas en Luxemburgo) y se incluyó un cultivo control, el cual estuvo exento del tratamiento con *A. annua*.

La respuesta cualitativa de los cultivos de epimastigotes de *T. cruzi* a las concentraciones de la infusión de *A. annua* se evaluó directamente al microscopio óptico, cada 24,00 horas, donde se observó cualitativamente la morfología y movilidad de los epimastigotes

de *T. cruzi*. Así mismo se determinó la densidad celular de los cultivos tratados y no tratados, contando los parásitos viables en una cámara de Neubauer, en diluciones adecuadas en buffer fosfato salino pH 7,40.

Viabilidad celular

La viabilidad celular de los epimastigotes de *T. cruzi* tratados y no tratados, se determinó por el método de exclusión del colorante azul de tripano, el cual se basa en la capacidad que tienen las membranas celulares intactas de eliminar rápidamente cualquier colorante. Si los parásitos se teñían de azul, esto indicaba que no eran viables; en cambio, los que permanecían sin teñir se encontraban viables (Kucsera *et al.*, 2000).

El conteo de parásitos viables se realizó mezclando volúmenes iguales del colorante azul de tripano (0,50%), y de los cultivos de epimastigotes de *T. cruzi* tratados y no tratados con la infusión de *A. annua*, luego de incubar esta mezcla aproximadamente 2 minutos, se observó al microscopio óptico para hacer el conteo en cámara de Neubauer y así determinar la densidad celular de los cultivos (Kucsera *et al.*, 2000).

Se calcularon varios índices de inhibición, según las fórmulas descritas por Simoni (2007), como se detalla a continuación:

Factor de crecimiento

Los factores de crecimiento (FC) de los cultivos controles y de los tratados con las diferentes concentraciones m/v de la infusión (0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00 y 3,00%) de *A. annua*, se estimaron mediante la siguiente fórmula:

$$FC = \frac{DCf}{DCi}$$

Donde:

DCf: densidad celular al final del tratamiento.

DCi: densidad celular al inicio del tratamiento.

Concentración inhibitoria

La concentración inhibitoria (CI) del crecimiento de los epimastigotes se calculó a través de la siguiente fórmula:

$$CI = \left[1 - \left(\frac{FC_t}{FC_c} \right) \right] \times 100$$

Donde:

FCt: Factor de crecimiento del cultivo tratado.

FCc: Factor de crecimiento del cultivo control.

Concentración inhibitoria del 50,00%

La concentración inhibitoria del 50,00% (CI₅₀) es la concentración de la infusión de la planta capaz de eliminar la mitad de los epimastigotes tratados en relación al máximo crecimiento obtenido por el cultivo control, en un período de tiempo determinado:

$$CI_{50} = \frac{1}{2} FC_{Cmáx}$$

Concentración mínima inhibitoria

La concentración mínima inhibitoria (CMI) es la mínima concentración de la infusión de la planta capaz de inhibir el crecimiento del 100% de los parásitos sin que ocurra muerte celular en un período de tiempo determinado:

$$CI_{50} = \frac{DCf}{DCi} = 1$$

Análisis estadístico

Para determinar el efecto de la concentración de la infusión de *A. annua* sobre el crecimiento de epimastigotes de *T. cruzi*, se aplicó un análisis de varianza multifactorial, y para conocer las diferencias significativas entre los diferentes grupos de tratamiento se

les aplicó una prueba *a posteriori* de rangos múltiples de Bonferroni (Sokal y Rohlf, 1979). Adicionalmente, se presentaron los resultados dispuestos en tablas y figuras que muestran los atributos morfológicos de la planta. Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico Statgraphics versión 4.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se presentan los resultados de las pruebas de viabilidad de las semillas de *A. annua* provenientes de Luxemburgo, donde se aprecia que éstas presentaron un bajo porcentaje de humedad ($9,68 \pm 1,06\%$). Según lo descrito por la Organización Mundial de la Salud (2006a), las semillas con un contenido de agua inferior a 13,00%, deben ser almacenadas por un período no mayor a 4 meses, ya que después de este tiempo pierden de forma considerable su viabilidad. Del mismo modo, el porcentaje de germinación *in vitro* ($3,67 \pm 1,53\%$), también fue bajo si se compara con las altas tasas de germinación encontradas por Li *et al.* (2012), en otras especies de *Artemisia*: 99,60%, 96,60% y 88,00% para *A. sieversiana*, *A. wudanica* y *A. halodendron*, respectivamente; quizás esto se deba a que en dicha investigación se usaron semillas frescas, recién colectadas; mientras que en el presente estudio, se desconoce la fecha de colecta de las semillas utilizadas.

En relación a la masa por semilla obtenida en esta investigación, se encontraron resultados similares a los de Jiang *et al.* (2010) quienes establecieron que las semillas de plantas control de *A. annua* silvestre pesaron $47,90 \pm 0,50$ μg . Igualmente concuerda con los datos registrados por la Organización Mundial de la Salud (2006a), la cual expresa que la masa aproximada de cada semilla corresponde con 30,00 μg . Estas semillas son muy livianas si se contrastan con las de *Ambrosia artemisiifolia* (otra Asteraceae), cuyas semillas poseen masas entre 1,72 y 3,60 mg (Fumanal *et al.*, 2007).

Tabla 1. Pruebas de calidad realizadas a las semillas de *Artemisia annua*.

Pruebas de viabilidad	Promedio	Desviación estándar	Límite inferior	Límite superior
Porcentaje de humedad (%)	9,68	1,06	8,91	10,90
Porcentaje de germinación <i>in vitro</i> (%)	3,67	1,53	2,00	5,00
Masa de cada semilla (μg)	42,50	1,90	40,40	44,00

Rojas y Aristizábal (2011), asocian, de manera proporcional, al contenido de agua de diversas semillas con el tamaño de las mismas; el bajo contenido de agua, masa y tamaño, posiblemente influyen en la disminución de la viabilidad presentada por las semillas de *A. annua*. Quizás para compensar este hecho, la planta produce gran cantidad de aquenios por capítulo, como un mecanismo de supervivencia en esta especie. En base a los datos ya expuestos, se deduce que las semillas usadas en esta investigación tuvieron una baja viabilidad, hecho que quizás afectó el desarrollo de las plantas, y pudiera atribuirse a la naturaleza misma de las semillas o al tiempo que tenían de colectadas.

Durante el proceso de germinación *in vitro*, se realizaron observaciones que complementan la información obtenida durante el cultivo, en la figura 1A, se aprecia como emerge la radícula del embrión, estructura que luego va a dar origen a las raíces de la planta; seguidamente en las figuras 1B y 1C se observa la elongación del hipocótilo o tallo de la plántula, y la elevación de los cotiledones que salen de la cubierta de la semilla, que se transformarán en las hojas cotiledóneas (fuente de energía de la plántula mientras desarrolla hojas verdaderas).




Figura 1. Semillas de *Artemisia annua* durante el proceso de germinación *in vitro* sobre papel de filtro. A: aparición de la radícula (r) del embrión; B: elongación del hipocótilo (h) y C: salida de los cotiledones (c) para formar las hojas cotiledóneas. Las figuras B y C son fotografías de la misma plántula tomada desde enfoques distintos.

En cuanto al cultivo en arena, se pudo observar que las semillas de *A. annua*

germinaron, agrónomicamente, desde el tercer hasta el octavo día después de la siembra, presentándose el mayor número de brotes (86 plántulas nuevas) al quinto día. Para el octavo día habían germinado 227 semillas, lo cual indica que el porcentaje de germinación agronómica fue de aproximadamente 0,02% (Figura 2).




Figura 2. Histograma de frecuencias del número de plántulas nuevas de *Artemisia annua* por día, en base a la siembra de 10 000 semillas en arena.

Las plantas sembradas en arena, se desarrollaron lenta y débilmente, asimismo manifestaron una producción de primordios florales de manera prematura al día 34 después de la siembra inicial, cuando aún estaban muy pequeñas, presentando alturas entre cinco a diez cm aproximadamente. Éstas se trasplantaron a un sustrato constituido por una mezcla de arena y tierra abonada, pero no respondieron de manera favorable a este proceso, todas las plantas desarrollaron botones florales o se marchitaron (Figura 3).

Müller y Brandes (1997), también obtuvieron resultados desfavorables en relación a la

siembra de *A. annua* en suelos arenosos, al obtener plantas que no sobrepasaban los 23 cm de altura en este sustrato.




Figura 3. Desarrollo de *Artemisia annua* durante el ensayo de germinación en arena. A: planta con desarrollo de brotes florales prematuros a los 34 días post-siembra; B: planta con brotes florales luego del trasplante; C: plántulas trasplantadas. Flechas: botones florales.

Debido al escaso desarrollo obtenido por las plantas en suelos arenosos, se sembraron las semillas de *A. annua* en tierra abonada (constituida por compost de caña de azúcar y humus). De esta forma se logró que las plántulas se desarrollaran de forma más adecuada, lo cual permitió la caracterización morfológica de esta especie y la obtención de la biomasa necesaria para la realización de los ensayos *in vitro*.

Müller y Brandes (1997) encontraron, de manera análoga a la presente investigación, que las semillas de *A. annua* germinaron al mismo tiempo en distintos tipos de suelo, de igual forma, sus plantas alcanzaron longitudes significativamente mayores en suelos

francos que en arenosos.

Las plantas cultivadas en tierra abonada, tampoco soportaron el proceso de trasplante, pues todas produjeron botones florales de manera prematura o murieron. Por lo tanto, y a pesar de que Liersch *et al.* (1986) han afirmado que el trasplante es el mejor método de establecimiento para esta planta, se prefirió no utilizar este paso, para que las plantas de *A. annua* crecieran un poco más en las bandejas de germinación y así obtener la mayor cantidad de hojas posible para realizar los estudios *in vitro* de *A. annua* contra *T. cruzi*.

En cuanto al tipo de suelo, las plantas de *A. annua* crecen mejor en tierra abonada; el compost a base de caña de azúcar fue muy útil en lo que respecta al mantenimiento de la humedad en los germinadores, pues este absorbe agua por más tiempo, favoreciendo el crecimiento de esta planta. Quizás la floración prematura ocurrió gracias a la disminución de la cantidad de horas de luz que recibieron las plantas, ya que esta especie requiere para su desarrollo un fotoperíodo de 13,50 horas, mayor al que se presenta en Venezuela (aproximadamente de 12,00 horas de luz), sumado a las altas temperaturas ambientales registradas en la ciudad de Cumaná (hasta 35°C) (Perlasca, 1952; Vila, 1965; Ferreira *et al.*, 1995).

Los atributos morfológicos de las plantas de *A. annua* desarrolladas durante esta investigación, se pueden resumir de la siguiente manera:

Las semillas presentaron una alta variabilidad en cuanto a su longitud, con rangos entre 0,64 y 1,09 mm y con una longitud promedio de $0,84 \pm 0,13$ mm. Mostraron formas piriformes, color crema y textura con surcos a lo largo de su eje longitudinal (Figura 4). La Organización Mundial de la Salud (2006a) confirman estos datos, expresando que las semillas de *A. annua* tienen aproximadamente 1,00 mm de longitud, son de color marrón amarillento y tienen superficie marcada por líneas verticales.

Estas semillas son muy pequeñas si se comparan con las de *Ambrosia artemisiifolia*

(3,50 mm de longitud), una especie parecida y cuyas semillas también varían mucho en su tamaño (Buttenschøn *et al.*, 2010).



Figura 4. Semillas de *Artemisia annua* junto a restos de flores, hojas y materia vegetal secos provenientes de Luxemburgo. Flechas: semillas.

La germinación agronómica en la tierra abonada se presentó a los 3-8 días post-siembra, al igual que en el ensayo en arena. Las plántulas resultantes tuvieron alturas de aproximadamente 5,00-10,00 mm, presentaron un par de hojas cotiledóneas verdes, redondeadas, de bordes enteros y 4 mm de longitud, las cuales aparecieron entre los 7-15 días después de la siembra, las primeras hojas verdaderas también surgieron en par y se mostraron verdes, dentadas, de unos 10,00 mm de longitud, luego fueron apareciendo de manera alterna, estas hojas cambiaron desde una forma dentada hasta obtener formas bipinaseptinadas y luego tripinaseptinadas de hasta 3,50 cm de longitud, con largos pecíolos. En cuanto al tallo de las plantas, durante la primera semana presentaron un aspecto débil, diámetro de 1,00-2,00 mm, textura lisa con pequeños tricomas, color verde más claro que el de las hojas, y la longitud desde el cuello hasta el ápice de la hoja más alta de 4,50 cm a las 4 semanas (Figura 5).

Según la Organización Mundial de la Salud (2006a), en Kenya y en la República Unida de Tanzania, la germinación de las semillas ocurre 4-10 días después de la siembra, en

Chongqing (China) y Vietnam, a los 7-10 días, y en Guangxi (China), a los 8-16 días; siendo semejantes a la fecha de germinación obtenida en la presente investigación.




Figura 5. Plantas de *Artemisia annua* en etapa de germinación y desarrollo foliar. A: plántulas en etapa de germinación, nótese las hojas cotiledóneas (c) y las hojas verdaderas (v); B: Planta en etapa de desarrollo foliar, donde se aprecia la aparición de las primeras hojas verdaderas en par (1°) y de las siguientes de manera solitaria y alterna (2°, 3°, 4°, 5° y 6°).

Algunas plantas no llegaron a emitir ramas, sin embargo, de la cuarta a la novena semana post-siembra las plantas que sí lo hicieron presentaban hojas claramente tripinaseptinadas, de colores que iban del verde manzana al verde oscuro en su superficie adaxial, con pequeños y cortos tricomas, que Spegazzini y Najera (1989), describen de dos tipos: tector pluricelular flageliforme y glandular pluricelular biseriado.

Las hojas en esta etapa son fuertemente aromáticas, y a las 10 semanas después de la siembra presentaban 12,00-13,00 cm de longitud desde la base del pecíolo hasta el ápice foliar. En cuanto a las medidas de los folíolos principales, éstas se especifican en la Figura 6. Cuando las plantas empezaron a ramificarse, sus tallos presentaron un diámetro de 2,00-4,00 mm, estriaciones longitudinales, seguían siendo de color verde

claro y alcanzaron alturas de hasta 45,00 cm, medidos desde el cuello hasta el ápice de la hoja más alta.




Figura 6. Longitudes de los folíolos principales en la hoja de *Artemisia annua* en la novena semana de crecimiento, al final de la etapa de ramificación.

En contraste con nuestros resultados, Jiang *et al.*, (2010) obtuvieron plantas de 1,28 m de altura, con hojas de 7,70 cm de largo, en promedio y tallos de 1,60 cm de diámetro, en Shanghai (China), evidentemente más desarrolladas que las plantas obtenidas en el presente estudio; y Vivas (1997) en San Antonio de los Altos (Venezuela), cultivó plantas con una amplia variedad de medidas, con alturas que iban de 21,00 a 115,00 cm, y hojas de 4,00 a 33,00 cm de longitud. El hecho de que esta planta se haya desarrollado de manera satisfactoria en otra región venezolana, puede significar que el fotoperíodo no fue el factor determinante en el resultado de los cultivos realizados en el presente trabajo, sino más bien la altitud o las temperaturas ambientales, considerando el hecho de que San Antonio de los Altos es una zona que se encuentra por encima de los 1 300 msnm y cuyas temperaturas van de 10 a 28°C, es decir, se encuentra en condiciones muy distintas a las de Cumaná, que se sitúa a apenas 5 msnm y registra temperaturas más

altas (entre 17 y 35°C) (Vila, 1965; Gutiérrez y Padrón, 2009).

El momento más apropiado para la colecta de las hojas con fines terapéuticos, es la etapa de brote floral, justo antes de la floración; cuando comienzan a aparecer los primeros botones que darán origen a las flores, según la literatura es en esta etapa cuando la concentración de artemisinina alcanza su máximo (Ferreira *et al.*, 1995).

La etapa de brote floral fue prematura, presentándose a partir de la cuarta semana después de la siembra. Los botones florales fueron precedidos por hojas bandera de al menos 2,00 cm de longitud (Figura 7). En la base peciolar de estas hojas se erigían pequeños primordios florales, que posteriormente con la aparición de sucesivos botones de manera alterna, formaron racimos que llegaron a poseer hasta más de 150 botones. Además, luego de iniciada esta etapa, la producción de hojas cesó gradualmente, esto podría atribuirse al hecho de que la planta concentra energía en la formación de flores y frutos; sin embargo, el crecimiento longitudinal de la planta sólo se detuvo al comenzar la floración, situación que concuerda con las experiencias en China, Vietnam y la República Unida de Tanzania; donde el desarrollo longitudinal cesó entre los 165 a 210 días después del trasplante, coincidiendo con el inicio de la floración (Organización Mundial de la Salud, 2006a).

La etapa de floración se inició a partir de la novena semana de crecimiento y se caracterizó por la presencia de inflorescencias plurifloras de unos 1,50 cm de longitud medidos desde la base del pedicelo, capítulos de 4,00 mm de diámetro y 6,00 mm de altura, aproximadamente. Los capítulos rodeados por brácteas verdes (Figura 7), con flores amarillas muy pequeñas, hermafroditas las centrales y femeninas las periféricas, estas flores producían un fino polen amarillo. Ferreira y Janick (1996), también describen a las inflorescencias como pequeños capítulos con flores de color amarillo; sin embargo, reportan capítulos más pequeños, de 2,00-3,00 mm de diámetro; de igual manera que Organización Mundial de la Salud (2006a) reporta capítulos de 2,00-2,50 mm de diámetro.

El fruto de *A. annua* es un aquenio con una semilla única en su interior (Organización Mundial de la Salud, 2006a). La mayoría de las plantas estudiadas, no produjeron gran cantidad de frutos, debido quizás a la falta de polinización a través del viento o insectos; sin embargo, las plantas que si lo hicieron mostraron aquenios lisos, verde amarillentos, cuya maduración daría origen a semillas (Figura 8). El marchitamiento de las plantas tuvo lugar a partir de la doceava semana de crecimiento.



Figura 7. Plantas de *Artemisia annua* en etapa de brote floral y de floración. A: brotes foliares junto a hojas bandera. B: inflorescencias.



Figura 8. Aquenios de *Artemisia annua* en desarrollo.

Aunque se logró que *A. annua* se desarrollara en condiciones ambientales típicas del noreste venezolano, el crecimiento de esta planta fue deficiente en comparación con lo reportado en otros países, lo cual pudo deberse principalmente a la baja calidad de las semillas, la temperatura ambiental o la altitud; sin embargo, el escaso crecimiento de las

plantas permitió la colecta del material foliar necesario para probar la actividad de las infusiones a diferentes concentraciones de m/v de hojas secas de *A. annua* sobre epimastigotes de *T. cruzi*. En la presente investigación las infusiones de *A. annua*, preparadas con hojas provenientes de Luxemburgo y con las hojas de plantas cultivadas en Cumaná, estado Sucre, tuvieron un efecto antiproliferativo dosis-dependiente sobre ambos aislados de *T. cruzi*.

En la figura 9 se puede apreciar una disminución de la tasa de crecimiento de los epimastigotes del aislado RG1 en todas las concentraciones ensayadas usando la infusión de *A. annua* cultivada en Cumaná, encontrándose al cuarto día de tratamiento una dosis letal del 23,00% (DL_{23}) y una DL_{31} con 2,00 y 3,00% de la infusión, respectivamente. A 7 días de exposición, se observó inhibición del 10,41%, 16,90%, 67,32% y 71,21%; con 0,40; 0,60 0,80 y 1,00%, respectivamente. A 2,00 y 3,00% se presentaron DL_{26} y DL_{50} , respectivamente. La CMI y la CI_{50} , se estimaron por extrapolación en la gráfica, obteniéndose los valores de 1,60% y 0,65%, de concentraciones m/v de infusión de la planta, respectivamente (Figura 10).




Figura 9. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1).




Figura 10. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1) a 7 días post-tratamiento.

El efecto antiproliferativo de la infusión de *A. annua* cultivada en Luxemburgo sobre el aislado RG1 fue mayor (Figura 11). Se observó disminución del crecimiento de los epimastigotes en todas las concentraciones ensayadas, así como un efecto tripanocida total (DL₁₀₀) con la concentración 3,00% y una DL₇₀ con 2,00%, ambas a 4 días de exposición. A 7 días de tratamiento se observó una inhibición del crecimiento de 80,63% a la menor concentración ensayada (0,40%) y muerte parasitaria total (DL₁₀₀) con 2,00 y 3,00% de la infusión.

La CMI y la CI₅₀, se estimaron por extrapolación en la gráfica, obteniéndose los valores de 0,62% y 0,25%, de concentraciones m/v de infusión de la planta, respectivamente (Figura 12). La CMI de este tratamiento fue 2,6 veces menor a la de la infusión de la planta cultivada en Cumaná sobre el mismo aislado (Figura 11), alcanzándose con la infusión de la planta de Luxemburgo una mayor inhibición del crecimiento de los epimastigotes del aislado RG1 con menores concentraciones y en menor tiempo.




Figura 11. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Luxemburgo a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1).




Figura 12. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Luxemburgo, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado RG1) a 7 días post-tratamiento.

En la Figura 13 se observa que la infusión de *A. annua*, cultivada en Cumaná ocasionó igualmente una disminución gradual de la densidad celular de los epimastigotes del aislado CHHP en todas las concentraciones ensayadas, con respecto al control; registrándose, al cuarto día de tratamiento porcentajes de inhibición del 51,34%, 66,74%, 77,07%, 76,85% y 84,38% concentraciones 0,40; 0,60, 0,80, 1,00 y 2,00%, así como una DL₈₀ con la concentración 3,00%. De la misma manera, al séptimo día de exposición, se encontró DL₂₅ y DL₈₉ con la concentración 2,00 y 3,00%, respectivamente. La CMI y la CI₅₀ se estimaron por extrapolación en la gráfica (Figura 14), obteniéndose los valores de 1,30% y 0,40% de concentraciones m/v de infusión de la planta, respectivamente; siendo esta CMI 1,2 veces menor a la encontrada en el aislado RG1 con las infusiones preparadas de las hojas cultivadas en Cumaná.




Figura 13. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado CHHP).

Al igual que lo observado en el aislado RG1 de *T. cruzi*, la infusión preparada con hojas de Luxemburgo tuvo un efecto más potente en la inhibición del crecimiento del aislado CHHP. El efecto tripanocida total (DL₁₀₀) se observó con la concentración 3,00% a 4 días de exposición, para ese día con la menor concentración ensayada se estimó un porcentaje de inhibición del 52,40%, así como DL₂₈, DL₅₇, DL₄₄ y DL₈₆ con 0,60; 0,80;

1,00 y 2,00%, respectivamente. A 7 días de tratamiento se encontró muerte parasitaria total (DL₁₀₀) con las concentraciones 2,00 y 3,00% (Figura 15). La CMI y la CI₅₀, se estimaron por extrapolación en la gráfica (Figura 16), obteniéndose los valores de 0,63% y 0,28%, de concentraciones m/v de infusión de la planta, respectivamente, siendo ésta CMI 2 veces menor a la encontrada en el aislado CHHP con las infusiones preparadas de las hojas cultivadas en Cumaná.




Figura 14. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Cumaná, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado CHHP) a 7 días post-tratamiento.

No se encontraron referencias bibliográficas en las que se haya valorado el efecto de la infusión de la planta sobre epimastigotes de *T. cruzi*; sin embargo, Mishina *et al.* (2007) probaron el efecto de la artemisinina y algunos de sus derivados purificados sobre dos especies de *Trypanosoma*, encontrando CI₅₀ que iban de 13,40 a 23,30 $\mu\text{mol.l}^{-1}$ para *T. cruzi*, y 15,70 a 22,50 $\mu\text{mol.l}^{-1}$ para *T. brucei rhodesiense*. Las infusiones de *A. annua* se han usado sobre *Plasmodium*, tal es el caso de Rocha *et al.* (2012), quienes evaluaron el efecto de infusiones de dicha planta cultivada en distintas regiones de Brasil sobre cepas

de *Plasmodium falciparum*, alcanzando CI_{50} de 0,11 a 0,40 μ l de infusión/ml.




Figura 15. Actividad de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Luxemburgo a distintas concentraciones, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado CHHP).




Figura 16. Curva dosis-respuesta para la determinación de la concentración inhibitoria del 50,00% y de la concentración mínima inhibitoria de la infusión de *Artemisia annua* cultivada en Luxemburgo, sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* (aislado CHHP) a 7 días post-tratamiento.

En la tabla 2 se presentan los porcentajes de inhibición del crecimiento de los aislados CHHP y RG1 de *T. cruzi* al ser sometidos a distintas concentraciones de la infusión de *A. annua* cultivada en Venezuela y Luxemburgo, luego de 7 días de exposición; en ella se aprecia que los porcentajes de inhibición fueron mayores para ambos aislados cuando se utilizaron las infusiones de la planta cultivada en Luxemburgo a las menores concentraciones (0,40 y 0,60%). Así como también se observa que la inhibición inducida por la infusión de la planta cultivada en Cumaná fue mayor en CHHP; en dicho aislado, expuesto a la infusión de *A. annua* proveniente de Luxemburgo, se observaron dosis letales desde la concentración 0,80% en adelante, en los demás grupos de tratamiento las dosis letales se percibieron en las concentraciones 2,00 y 3,00%.

Tabla 2. Porcentajes de inhibición del crecimiento de los aislados de *Trypanosoma cruzi* (CHHP y RG1) a las diferentes concentraciones de la infusión de *Artemisia annua* a 7 días de exposición.

Concentraciones de la infusión de <i>Artemisia annua</i> (% m/v) (CI)	Aislado CHHP		Aislado RG1	
	Infusión de <i>A. annua</i> cultivada en Luxemburgo (% de inhibición)	Infusión de <i>A. annua</i> cultivada en Cumaná (% de inhibición)	Infusión de <i>A. annua</i> cultivada en Luxemburgo (% de inhibición)	Infusión de <i>A. annua</i> cultivada en Cumaná (% de inhibición)
0,40	70,99	51,49	80,63	10,41
0,60	93,63	68,47	88,45	16,90
0,80	-*	76,46	94,30	67,32
1,00	-*	76,72	91,86	71,21
2,00	-*	-*	-*	-*
3,00	-*	-*	-*	-*

%; porcentaje; % m/v: porcentaje masa/volumen; CI: concentración inhibitoria; *: dosis letal.

De igual forma, se apreció que a mayor concentración de la planta en los medios de cultivo y a mayor número de días de exposición, los epimastigotes perdieron gradualmente su movilidad, cambiaron su morfología típica fusiforme a una forma alargada y delgada o redondeada sin flagelo (Figura 17). De manera análoga a la presente investigación, Blanco *et al.* (1983) encontraron que los epimastigotes de *T. cruzi* presentaron reducción de la movilidad, así como alteraciones morfológicas (la mayoría de los parásitos adoptaron formas redondeadas) al ser tratados con gospol, un

compuesto aislado de la planta de algodón. Del mismo modo, en la investigación de Santoro *et al.* (2007), se demostró que los aceites esenciales del tomillo (*Thymus vulgaris* L.) y el orégano (*Origanum vulgare* L.) son eficaces contra epimastigotes de *T. cruzi*, y a través de microscopía electrónica de transmisión observaron que los extractos de estas plantas produjeron alteraciones estructurales en el parásito, principalmente hinchamiento del citoplasma.




Figura 17. Cambios morfológicos de los epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* en cultivos con infusiones de *Artemisia annua* (400X). Forma fusiforme (A) en medio sin *Artemisia annua*, forma alargada (B) y forma redondeada (C) en medios con *Artemisia annua*.

El análisis de varianza multifactorial reveló que el efecto de las infusiones sobre la densidad celular de los epimastigotes de *T. cruzi*, fue ejercido de manera altamente significativa ($p=0,00$) por el tipo de infusión, la concentración de la misma y el tiempo de exposición. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la acción de las infusiones sobre los distintos aislados, lo que indicó que las infusiones preparadas con las plantas de *A. annua* cultivadas en Cumaná y Luxemburgo ejercieron similar efecto antiproliferativo en ambos aislados de *T. cruzi* evaluados (RG1 y CHHP) (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de varianza multifactorial para la densidad celular de epimastigotes de *Trypanosoma cruzi*, bajo acción de las infusiones de *Artemisia annua*.

Fuentes de variación	Suma de los cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F	P
Efectos principales					
A: Infusión	2,13883	1	2,13883	23,28	0,0000*
B: Concentración	23,1363	6	3,85605	41,97	0,0000*
C: Aislado	0,298008	1	0,298008	3,24	0,0737
D: Tiempo	2,88899	5	0,577797	6,29	0,0000*
Residual	13,5982	148	0,0918797		
Total (corregido)	43,0114	161			

(*): Denota diferencias estadísticas significativas ($p<0,05$); F: prueba de Fisher; P: probabilidad.

El análisis *a posteriori*, según la prueba de rangos múltiples de Bonferroni, mostró que la infusión de *A. annua* preparada con hojas provenientes de Luxemburgo tuvo un mayor efecto en la inhibición de los parásitos, que la infusión hecha con hojas provenientes de Cumaná. Referente a la concentración, se observó la formación de dos grupos homogéneos, lo que indica que hubo diferencias significativas en la densidad celular de epimastigotes de *T. cruzi*, en casi todas las concentraciones ensayadas con respecto al control (menos a la concentración más baja). Igualmente, se presentaron diferencias significativas entre las concentraciones 0,40; 0,60% y 0,80% con respecto a la concentración 3,00%. En cuanto al tiempo de incubación de los cultivos en la infusión de *A. annua*, se encontraron diferencias significativas entre los días 0, 1, 2 y 3 con respecto al día 7, lo cual hace pensar que los primeros días del tratamiento son claves en

la inhibición activa de los epimastigotes de *T. cruzi*.

El mayor efecto antiproliferativo que ejerció la infusión preparada con la planta proveniente de Luxemburgo, con respecto a la planta cultivada en Cumaná, pudo deberse a distintos factores, como la distinta producción de aceites esenciales de ambas plantas. Se desconoce la composición de los metabolitos expresados por las plantas cultivadas en Cumaná; sin embargo, se ha comparado la distribución de metabolitos de *A. annua* cultivada en Luxemburgo con muestras de la planta proveniente de distintos países, encontrando que, si bien, no es la más rica en artemisinina, si lo es en aceites esenciales (1,8 cineol, limoneno, terpineol, entre otros) y scopoletina, compuestos que junto a los flavonoides y cumarina pudieran potenciar el efecto de la artemisinina (Lutgen, 2011).

Otros aspectos que pudieron influir son las diferentes condiciones ambientales en las que se desarrollaron las plantas. En Cumaná se alcanzan temperaturas de 35°C, casi el doble de la temperatura máxima de Luxemburgo (17°C) (Vila, 1965; Servicio Meteorológico de Luxemburgo, 2012). En relación a este tema, Ferreira *et al.* (1995) sostienen que las elevadas temperaturas ambientales producen una disminución en las concentraciones de artemisinina. Sumado a esto, se ha demostrado que el contenido de artemisinina en *A. annua* varía dependiendo de estas condiciones entre 0,02% y 1,10%. Otros autores han comprobado que la producción de artemisinina por la planta está sujeta a control genético. Actualmente se ha desarrollado, para la producción comercial de artemisinina, un híbrido de la planta denominado *Artemis*, del cual se han obtenido rendimientos de hasta del 1,40% de artemisinina a partir de hojas secas de la planta (Ferreira *et al.*, 1995; Delabays *et al.*, 2001; Organización Mundial de la Salud, 2006a; Graham *et al.*, 2010).

Las infusiones de *A. annua* resultaron eficaces en la inhibición de los epimastigotes de *T. cruzi* durante los 7 días de tratamiento, este hecho sugiere que los demás compuestos presentes en la infusión, pudieran actuar sinérgicamente para ejercer su acción antiproliferativa, pues se ha comprobado que la artemisinina contenida en la infusión

muestra perdida de sus efectos luego de las 24,00 horas de exposición, de esta forma se afianza la teoría de que las infusiones de *A. annua* no son monoterapias de artemisinina, sino una politerapia de sustancias que actúan juntas (Lutgen y Michaels, 2008; Lutgen, 2009). A este respecto, Liu *et al.* (1992) demostraron que los flavonoides presentes en la planta no presentan un efecto antimalárico, pero si un efecto potenciador de la actividad de la artemisinina, y Nandakumar *et al.* (2006) comprobaron el efecto sinérgico entre el arteether y la curcumina.

La acción de la infusión de esta planta depende de los efectos sinérgicos de 36 flavonoides, 29 sesquiterpenos y una variedad de aceites naturales (Willcox *et al.*, 2004). Como se ha demostrado previamente, en algunos casos aislar un sólo componente o la búsqueda de un principio activo, en un producto natural, demuestra que la eficacia del producto herbal se debe a la sinergia de sus constituyentes. Este es el caso de la raíz de ortiga (*Urtica dioica*), usada de forma tradicional en el tratamiento del cáncer de próstata, se ha demostrado que su acción se debe a la sinergia entre el efecto antiproliferante de un grupo de isolectinas llamadas aglutininas de *Urtica dioica* y el efecto antiinflamatorio de polisacáridos aislados de la raíz (Wagner, 2006).

En cuanto a la aparición de cepas resistentes con el uso de la infusión, hay menos probabilidades de que se presente si consideramos que el té es una combinación de varias sustancias con poder antiparasitario comprobado. En un estudio realizado en Uganda, se administraron infusiones de *A. annua* a individuos con malaria, encontrando que redujeron significativamente el riesgo de sufrir reincidencia en nueve meses, en un 55,00%; la investigación mencionada expone que dadas las bajas concentraciones de artemisinina en las infusiones usadas, el efecto protector podría atribuirse a un grupo de flavonoides inmunomoduladores presentes en las mismas (Ogwang *et al.*, 2012). El efecto antiproliferativo de la infusión sobre los parásitos podría disminuir con la separación en fracciones o con el aislamiento de las moléculas en la suspensión (Campos *et al.*, 2005). Además, se ha comprobado que la artemisinina presente en la infusión se absorbe más rápido que aquella presente en las cápsulas o tabletas y por lo tanto, la

biodisponibilidad de ésta en el té o infusión es mayor (Räth *et al.*, 2004).

Aunque son pocos los trabajos acerca de la acción de *A. annua* sobre *T. cruzi*, anteriormente muchos investigadores han evaluado el efecto de numerosas plantas medicinales tradicionales contra este parásito, tal es el caso de Luize *et al.* (2005) quienes encontraron que las especies usadas en la medicina tradicional brasileña: *Cymbopogon citratus*, *Matricaria chamomilla*, *Piper regnellii* Miq., *Tanacetum parthenium* y *Tanacetum vulgare* L. mostraron efectos significativos en la inhibición del crecimiento, tanto para epimastigotes de *T. cruzi* como para promastigotes de *Leishmania amazonensis*.

Por su parte Muñoz *et al.* (2010) evaluaron el potencial tripanocida de extractos etanólicos de 4 plantas medicinales bolivianas, encontrando que *Anacardium occidentale* y *Bowdichia virgilioides* fueron activos *in vitro*, más no *in vivo*. Del mismo modo, en Perú Rojas *et al.* (2010), comprobaron la inhibición del desarrollo de epimastigotes de *T. cruzi* por parte de los aceites esenciales de *Cymbopogon citratus* (hierba luisa) y *Aloysia triphylla* (cedrón), así como la no toxicidad de estas plantas sobre células mamíferas. Similarmente, se ha probado el efecto tripanocida de algunas plantas colombianas sobre epimastigotes (*Cuatresia riparia*, *Larnax sachapapa*, *Solanum laevigatum*, *S. nematorhachis*, *S. psychotrioides* y *Acnistus arborecens*) tripomastigotes (*S. nematorhachis*, *S. psycotroides* y *L. sachapapa*) y amastigotes (*Hieronyma antioquiensis*) de *T. cruzi* (Valencia *et al.*, 2011). Todos estos esfuerzos demuestran un gran potencial de nuevas alternativas, de origen natural, para el tratamiento de la enfermedad de Chagas.

Los resultados obtenidos en este trabajo abren nuevas perspectivas de investigación sobre la acción tripanocida de *A. annua* sobre *T. cruzi* y ofrecen una alternativa terapéutica para el tratamiento de la infección por este parásito, en especial la preparación de infusiones, pues resultan ser una opción accesible, de bajo costo, fácil de preparar y administrar. Mejorando las condiciones de cultivo de *A. annua* o ensayando

su cultivo en zonas más altas y templadas del oriente venezolano, pudiera producirse a gran escala esta poderosa fuente medicinal en Venezuela.

CONCLUSIONES

Las semillas de *A. annua* provenientes de Luxemburgo tuvieron una calidad reducida.

Las plantas de *A. annua* presentaron durante su ciclo de vida alturas máximas de 45,00 cm, hojas primero dentadas, luego bipinatisectas y finalmente tripinatisectas de hasta 13,00 cm de longitud, tallos de hasta 5,00 mm de diámetro e inflorescencias plurifloras, en capítulos de 6,00 mm de diámetro aproximadamente. Estas plantas se desarrollaron pobremente en comparación con lo reportado en otros países.

Las semillas de *A. annua* necesitan sembrarse a poca profundidad del suelo, ya que su germinación es activada en gran manera por la luz solar. Del mismo modo, se necesita constante humedad del sustrato para la germinación y crecimiento de esta especie que, se desarrolla bien en suelo a base de humus y compost de caña de azúcar, siendo éstos útiles por su fertilidad y capacidad de retención de agua. Del mismo modo, el proceso de trasplante no favoreció la producción de biomasa de la planta *A. annua*.

Se logró la producción de cultivos axénicos de epimastigotes de *T. cruzi* de los aislados RG1 y CHHP.

Las infusiones de *A. annua* ejercieron un efecto antiproliferativo dosis-dependiente sobre los aislados de epimastigotes de *T. cruzi* RG1 y CHHP, este efecto depende del tipo de infusión, la concentración de la misma y el tiempo al cual los parásitos estén expuestos a la infusión.

La infusión de *A. annua* proveniente de Luxemburgo tiene un mayor efecto antiproliferativo sobre los dos aislados de *T. cruzi* evaluados, que la infusión de *A. annua* cultivada en Cumaná.

La infusión de *A. annua* proveniente de Luxemburgo tuvo una CMI 2,6 veces menor que

la infusión de *A. annua* cultivada en Cumaná sobre el aislado RG1 y 2 veces menor sobre el aislado CHHP.

RECOMENDACIONES

El cultivo de *A. annua* en condiciones climáticas del noreste venezolano requiere de una previa tropicalización o adaptación de las plantas a estas condiciones, para que puedan alcanzar mayor altura y producir más biomasa.

La implementación de sistemas de lámparas para acortar el fotoperíodo de las plantas así como sistemas de riego programado mejoraría en gran manera el cultivo de grandes cantidades de esta planta medicinal.

Se recomienda seguir las investigaciones acerca de la acción de esta planta sobre *T. cruzi*, ya que existen muy pocos estudios acerca de la misma y sus infusiones pueden constituir una buena alternativa terapéutica en el tratamiento de la infección por este parásito. Siendo ya comprobada la acción de las infusiones de *A. annua* sobre el parásito *in vitro* sería conveniente realizar estudios *in vivo* en animales de experimentación y comparar el efecto de la infusión con la acción de los compuestos activos de la planta purificados sobre animales infectados con *T. cruzi*.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, L.; Hechevarría, I. y Rodríguez, C. 2011. Influencia de las condiciones de cultivo y del momento óptimo de cosecha en *Artemisia annua* L. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, 16(1): 105-114.
- Arrow, K.; Gelband, H. y Jamison, D. 2005. Making antimalarial agents available in Africa. *New England Journal of Medicine*, 353(4): 333-335.
- Bagchi, G.; Jain, D. y Kumar, S. 1997. Arteether: a potent plant growth inhibitor from *Artemisia annua*. *Phytochemistry*, 45(6): 1131-1133.
- Berrizbeitia, M.; Ndao, M.; Gottschalk, M.; Aché, A.; Vásquez, F.; Lacouture, S.; Mehudy, M. y Ward, B. 2004. Development and comparison of an enzyme immunoassays for diagnoses of Chagas disease using fixed forms of *Trypanosoma cruzi* (epimastigotes, amastigotes and trypomastigotes) and assessment of antigen stability for the three assays. *Journal of Clinical Microbiology*, 42(4): 1766-1769.
- Bhakuni, R.; Jain, D.; Kumar, S. y Sharma, R. 2001. Secondary metabolites of *Artemisia annua* and their biological activity. *Current Science*, 80: 35-48.
- Biesen, C. 2010. The rise to prominence of *Artemisia annua* L. - the transformation of a Chinese plant to a global pharmaceutical. *African Sociological Review*, 14(2): 24-46.
- Blanco, A.; Aoki, A.; Montamat, E. y Rovai, L. 1983. Effect of gossypol upon motility and ultrastructure of *Trypanosoma cruzi*. *Journal of Eukaryotic Microbiology*, 30: 648-651.
- Buttenschøn, R.; Waldspühl, S. y Bohren, C. 2010. Guidelines for management of common ragweed, *Ambrosia artemisiifolia*, Forest & Landscape, University of Copenhagen. <http://xwww.agrsci.dk/ambrosia/outputs/ambrosia_eng.pdf> (25/10/2013)
- Campos, F.; Januário, A.; Rosas, L.; Nascimento, S.; Pereira, P.; França, S.; Coreiro, M.; Toldo, M. y Albuquerque, S. 2005. Trypanocidal activity of extracts and fractions of *Bertholletia excelsa*. *Fitoterapia*, 76: 26-29.
- Carmargo, L.; Oliveira, S.; Basano, S. y Garcia, C. 2009. Antimalarials and the fight against malaria in Brazil. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 5: 311-317.
- Castro, J. y Díaz, E. 1988. Toxic effects of nifurtimox and benznidazole, two drugs used against american trypanosomiasis (Chagas disease). *Biomedical and Environmental Sciences*, 1(1): 19-33.
- Cordero, C. 2002. Radiosensibilidad en tres especies de *Cucurbitaceae*: *Citrullus*

lanatus L; *Cucumis sativus* L; *Cucumis melo* L. Trabajo de pregrado. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Davies, M.; Atkinson, C.; Burns, C.; Woolley, J.; Hipps, N.; Arroo, R.; Dungey, N.; Robinson, T.; Brown, P.; Flockart, I.; Hill, C.; Smith, L. y Bentley, S. 2009. Enhancement of artemisinin concentration and yield in response to optimization of nitrogen and potassium supply to *Artemisia annua*. *Annals of Botany*, 104: 315-323.

Delabays, N.; Benakis, A. y Collet, G. 1993. Selection and breeding for high artemisinin (Qinghaosu) yielding strains of *Artemisia annua* L. *Acta Horticultura*, 330: 203-207.

Delabays, N.; Simonnet, X. y Gaudin, M. 2001. The genetics of artemisinin content in *Artemisia annua* L. and the breeding of high yielding cultivars. *Current Medicinal Chemistry*, 8(15): 795-1801.

De Magalhães, P.; Figueira, G.; Rehder, V.; Sartoratto, A. y Vaz, A. 2006. Agronomic and chemical evaluation of a hybrid of the antimalarial species *Artemisia annua* L. for São Paulo state regions. *Revista Brasileira de Plantas Mediciniais*, 8: 199-200.

De Oliveira, T.; Oliveira, D.; Rostkowska, C.; Ribeiro, S.; Ferro, E.; Magalhães, P. y Mineo, J. 2009. *Toxoplasma gondii*: effects of *Artemisia annua* L. on susceptibility to infection in experimental models *in vitro* and *in vivo*. *Experimental Parasitology*, 122(3): 233-241.

Díaz, L. 2002. Estudio cromosómico y determinación de los efectos de la colchicina sobre la germinación y fase inicial del desarrollo en *Annona muricata* L. (*Annonaceae*). Trabajo de pregrado. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Feliciangeli, D. 2009. Control de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Logros pasados y retos presentes. *Interciencia*, 34(6): 393-399.

Ferreira, J. 2007. Nutrient deficiency in the production of artemisinin dihydroartemisinic acid, and artemisinic acid in *Artemisia annua* L. *Journal of Agriculture Food Chemistry*, 55: 1686-1694.

Ferreira, J. y Janick J. 1996. Distribution of artemisinin in *Artemisia annua*. En: *Progress in new crops*. Janick, J. (ed). ASHS Press. Arlington, VA. Págs. 579-584. <<http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1996/V3-578.html>> (04/04/2010)

Ferreira, J.; Simon, J. y Janick, J. 1995. Developmental studies of *Artemisia annua*: Flowering and artemisinin production under greenhouse and field conditions, *Planta Medica*, 61: 167-170.

Ferreira, J.; Simon, J. y Janick, J. 1997. *Artemisia annua*: Botany, horticulture, pharmacology. *Horticulture Reviews*, 19: 319-371.

- Filardi, L. y Brener, Z. 1987. Susceptibility and natural resistance of *Trypanosoma cruzi* strains to drugs used clinically in Chagas disease. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 81: 755-759.
- Fournet, A.; Muñoz, V.; Roblot, F.; Hocqueniiller, R.; Cavé, A. y Gantier, J. 1993. Antiprotozoal activity of dehydrozalanin C, a sesquiterpene lactone isolated from *Munnozia maronii* (Asteraceae). *Phytoteraphy Research*, 7: 111-115.
- Fumanal, B.; Chauvel, B.; Sabatier, A. y Bretagnolle, F. 2007. Variability and Cryptic Heteromorphism of *Ambrosia artemisiifolia* Seeds: What Consequences for its Invasion in France?. *Annals of Botany*, 100(2): 305-313.
- Graham, I.; Besser, K.; Blumer, S.; Branigan, C.; Czechowski, T.; Elias, L.; Guterman, I.; Harvey, D.; Isaac, P.; Khan, A.; Larson, T.; Li, Y.; Pawson, T.; Penfield, T.; Rae, A.; Rathbone, D.; Reid, S.; Ross, J.; Smallwood, M.; Segura, V.; Townsend, T.; Vyas, D.; Winzer, T. y Bowles, D. 2010. The genetic map of *Artemisia annua* L. identifies loci affecting yield of the antimalarial drug artemisinin. *Science*, 327: 328-331.
- Grases, J.; Malaver, A.; Montes, L.; Gonzalez, M.; Herrera, C.; Acosta, L.; Lugo, M.; Madriz, J.; Hernández, J. y Vargas, R. 2004. Amenazas naturales y vulnerabilidad en Cumaná. *Instituto De Materiales y Modelos Estructurales*, 42(3): 57-80.
- Gutiérrez, E. y Padrón, R. 2009. Centro virtual de meteorología. Clima de los Altos Mirandinos. <http://met.ivic.gob.ve/clima_AM.html> (03/11/2012).
- Hómez, J.; Soto, R.; Tarazón, S.; Méndez, H. y Mármol, P. 2007. *Parasitología*. Undécima edición. Editorial de la Universidad del Zulia. Maracaibo.
- Jiang, L.; Liu, H.; Wang, J.; Tan, F.; Zhao, K.; Wu, X.; Zhu, H.; Tang, K. y Tang, X. 2010. Characterization and comparison of three transgenic *Artemisia annua* varieties and wild-type variety in environmental release trial. *Journal of Medicinal Plants Research*, 4(24): 2719-2728.
- Klayman, D. 1985. Qinghaosu (artemisinin): an antimalarial drug from China. *Science*, 228: 1049-1055.
- Krishna, S.; Uhlemanna, A. y Haynes, R. 2004. Artemisinins: mechanisms of action and potential for resistance. *Drug Resistance Updates*, 7: 233-244.
- Kucsera, J.; Yarita, K.; Takeo, K. 2000. Simple detection method for distinguishing dead and living yeast colonies. *Journal of Microbiological Methods*, 41(1): 19-21.
- Kulkarni, R. 2002. *Artemisia pallens*. En: *Artemisia. Medicinal and aromatic plants - Industrial profiles*. Wright, C. (ed). Taylor & Francis. Londres. Págs. 119-137.

- Laskowski, L. y Bautista, D. 2002. Efecto de la escarificación y profundidad de siembra sobre la germinación y emergencia de *Malpighia emarginata* DC. *Bioagro*, 14(2): 77-83.
- Laughlin, J.; Heazlewood, G. y Beattie, B. 2002. Cultivation of *Artemisia annua* L. En: *Artemisia. Medicinal and aromatic plants - Industrial profiles*. Wright, C. (ed). Taylor & Francis. Londres. Págs.159-195.
- Li, X.; Jiang, D.; Zhou, Q. y Oshida, T. 2012. Comparison of seed germination of four *Artemisia* species (Asteraceae) in northeastern Inner Mongolia, China. *Journal of Arid Land*, 4(1): 36-42.
- Li, Y. ; Huang, H. y Wu, Y. 2006. Qinghaosu (artemisinin) - a fantastic antimalarial drug from a traditional chinese medicine. En: *Medicinal Chemistry of Bioactive Natural Products*. Fang, W. y Liang, X. (eds). Wiley Interscience. New Jersey. Pags. 183-239.
- Liersch, R.; Soicke, H.; Stehr, P. y Tullner, H. 1986. Formation of artemisinin in *Artemisia annua* during one vegetation period. *Planta Medica*, 7: 387-390.
- Liu, K.; Yang, S.; Roberts, S.; Elford, B. y Phillipson, J. 1992. Antimalarial activity of *Artemisia annua* flavonoids from whole plants and cell cultures. *Plant Cells Reports*, 11: 637-640.
- Luize, P.; Tiunan, T.; Morello, L.; Maza, P.; Ueda-Nakamura, T.; Dias, B.; Garcia, D.; Palazzo, J. y Nakamura, C. 2005. Effects of medicinal plant extracts on growth of *Leishmania (L.) amazonensis* and *Trypanosoma cruzi*. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 41(1): 85-94.
- Luo, X. y Shen, C. 1987. The chemistry, pharmacology and clinical application of qinghaosu (artemisinin) and its derivatives. *Medicinal Research Reviews*, 7: 29-52.
- Lutgen, P. 2009. La tisane d'*artemisia annua*, une puissante polythérapie!. Résultats scientifiques et nouvelles pistes de recherche dans 2ème congrès "Maladies tropicales, aspects humanitaires et scientifiques" <http://www.aliai.lu/YT2010/wp-content/uploads/2009/06/revue_tisane.pdf> (12/04/2011)
- Lutgen, P. 2011. La familia de las artemisias ofrece una politerapia poderosa contra las enfermedades tropicales y la disentería. *Biomédica*, 31(3): 206-208.
- Lutgen, P. y Michels, B. 2008. Bactericidal properties of *Artemisia annua* tea and dosimetry of artemisinin in water by fluorescence under UV light. *Revue Technique Luxembourgeoise*, 2: 73-78.
- Meshnick, S. 1994. The mode of action of antimalarial peroxides. *Transactions of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 11: 31-32.

- Michaelis, M.; Kleinschmidt, M.; Barth, S.; Rothweiler, F.; Geiler, J.; Breitling, R.; Mayer, B.; Deubzer, H.; Witt, O.; Kreuter, J.; Doerr, H.; Cinatl, J. y Cinatl, J. 2010. Anti-cancer effects of artesunate in a panel of chemoresistant neuroblastoma cell lines. *Biochemical Pharmacology*, 79(2): 130-136.
- Mishina, Y.; Haynes, R.; Krishna, S. y Meade, J. 2007. Artemisinin inhibit *Trypanosoma cruzi* and *Trypanosoma brucei rhodesiense* *in vitro* growth. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 51: 1852-1854.
- Mucciarelli, M. y Maffei, M. 2002. Introduction to the genus. En: *Artemisia. Medicinal and aromatic plants - Industrial profiles*. Wright, C. (ed). Taylor & Francis. Londres. Págs. 1-50.
- Mueller, M.; Karhagomba, I.; Hirt, H. y Wemakor, E. 2000. The potential of *Artemisia annua* L. as a locally produced remedy for malaria in the tropics: agricultural, chemical and clinical aspects. *Journal of Ethnopharmacology*, 73: 487-493.
- Müller, M. y Brandes, D. 1997. Growth and development of *Artemisia annua* L. on different soil types. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie*, 27: 453-460.
- Muñoz, V.; Duchén, E.; Wagner, F.; Ferreira, M.; Serna, E.; Torrez, S.; Yaluff, G.; Ayaviri, M. y Vera, N. 2010. Actividad tripanocida *in vitro* e *in vivo* de extractos etanólicos de algunas plantas medicinales bolivianas. *BIOFARBO*, 18(1): 69-75.
- Nandakumar, D.; Nagaraj, V.; Vathsala, P.; Rangarajan P. y Padmanaban, G. 2006. Curcumin-artemisinin combination therapy for malaria. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 50(5): 1859-1860.
- Ogwang, P.; Ogwal, J.; Kasasa, S.; Olila, D.; Ejobi, F.; Kabasa, D. y Obua, C. 2012. *Artemisia annua* L. infusion consumed once a week reduces risk of multiple episodes of malaria: a randomised trial in a Ugandan community. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 13(3): 445-453.
- Organización Mundial de la Salud. 2006a. Monography on good agricultural and collection practices of *Artemisia annua* L. Geneva: World Health Organization Publication.
- Organización Mundial de la Salud. 2006b. Guidelines for the treatment of malaria. Geneva: World Health Organization Publication.
- Perlasca, G. 1952. Algunos problemas genéticos y fisiológicos que condicionan la producción de cebolla en el trópico. *Agronomía Tropical*, 2(1): 23-30.
- Räth, K.; Taxis, K.; Walz, G.; Gleiter, C.; Li, S. y Heide, L. 2004. Pharmacokinetic study of artemisinin after oral intake of a traditional preparation of *Artemisia annua* L. (annual

- wormwood). *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 70(2): 128-132.
- Restrepo, A.; Muñoz, D.; Upegui, Y.; Lutgen, P.; Vélez, I. y Robledo, S. 2011. Utilidad de *Artemisia annua* como tratamiento en leishmaniasis cutánea, estudios *in vitro* e *in vivo*. *Biomédica*, 31(3): 412.
- Rocha, L.; De Magalhães, P.; Farias, M.; Costa, M.; Maia, F.; Hidalgo, A.; Pohlit, A. y Ribeiro, P. 2012. *In vitro* susceptibility of *Plasmodium falciparum* Welch field isolates to infusions prepared from *Artemisia annua* L. cultivated in the Brazilian Amazon. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 107(7): 859-866.
- Rodríguez, A. 2005. Nuevas perspectivas en el manejo terapéutico de la enfermedad de Chagas. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 22(2): 123-133.
- Rojas, A. y Aristizábal, I. 2011. Efecto del contenido de humedad sobre propiedades físicas de la semilla de Vitabosa (*Mucuna deeringiana*). *Revista Facultad Nacional de Agronomía de Medellín*, 64(1): 5961-5971.
- Rojas, J.; Solís, H. y Palacios, O. 2010. Evaluación *in vitro* de la actividad anti *Trypanosoma cruzi* de aceites esenciales de diez plantas medicinales. *Anales de la Facultad de Medicina*, 71(3): 161-165.
- Sandoval, M. 2009. Control biológico de *Colletotrichum fusarioides* O'Gara, patógeno de semillas de albahaca (*Ocimum basilicum* L.) con *Trichoderma* Rifai. *Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas*, 8(2): 104-109.
- Santoro, G.; Cardoso, M.; Guimarães, L.; Salgado, A.; Menna-Barreto, R. y Soares, M. 2007. Effect of oregano (*Origanum vulgare* L.) and thyme (*Thymus vulgaris* L.) essential oils on *Trypanosoma cruzi* (Protozoa: Kinetoplastida) growth and ultrastructure. *Parasitology Research*, 100(4): 783-790.
- Sen, R.; Bandyopadhyay, S.; Dutta, A.; Mandal, G.; Ganguly, S.; Saha, P. y Chatterjee, M. 2007. Artemisinin triggers induction of cell-cycle arrest and apoptosis in *Leishmania donovani* promastigotes. *Journal of Medical Microbiology*, 56(9): 1213-1218.
- Servicio Meteorológico de Luxemburgo. 2012. Climatology. Information on the climate in Luxembourg in 2011. Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg. http://www.meteolux.lu/IMG/pdf/Re_sume_climatologique_2011_WMO_06590_TA_R_R.pdf (07/09/2012).
- Simoni, Z. 2007. Estudio del efecto de la combinación de 22-hidrazona-imidazolin-z-il-5-colesta-3 β -oly [Cu(dppZ)₂NO₃]NO₃ sobre promastigotes de *Leishmania* (v.) *braziliensis*. Trabajo de Maestría. Postgrado en Biología Aplicada. Universidad de Oriente, Cumaná.

- Sokal, J. y Rohlf, J. 1979. *Biometría, principios y métodos estadísticos aplicados a la investigación biológica*. Hermann Blume Ediciones. Barcelona, España.
- Spegazzini, E. y Najera, M. 1989. *Artemisia annua* L. (Compositae- Anthemideae). Aspectos farmacognósticos. *Acta Farmacologica Bonuerense*. 8(2): 95-100.
- Stoppani, A. 1999. Quimioterapia de la enfermedad de Chagas. *Medicina*, 59(2): 147-165.
- Sülsen, V.; Frank, F.; Cazorla, S.; Anesini, C.; Malchiodi, E.; Freixa, B.; Vila, R.; Muschiatti, L. y Martino, V. 2008. Trypanocidal and leishmanicidal activities of sesquiterpene lactones from *Ambrosia tenuifolia* Sprengel (Asteraceae). *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 52(7): 2415-2419.
- Swapnadeep, P.; Jain, D. y Joshi, S. 2009. Comparison of antiinflammatory activity of *Artemisia annua* leaves extracts obtained through conventional and new method. *Journal of Pharmacy Research*, 2(1): 1-5.
- Trigg, P. 1989. Qinghaosu (artemisinin) as an antimalarial drug. *Economic and Medicinal Plant Research*, 3: 19-55.
- Valencia L.; Muñoz D.; Robledo S.; Echeverri F.; Arango G.; Vélez I. y Triana O. 2011. Actividad tripanocida y citotóxica de extractos de plantas colombianas. *Biomédica*, 31(4): 552-559.
- Vila, M. 1965. *Aspectos geográficos del estado Sucre*. Corporación Venezolana de Fomento. Serie "Monografías Estadales". Caracas.
- Vivas, R. 1997. Determinación y aislamiento de artemisinina en *Artemisia annua* L. cultivada en Venezuela. Trabajo de pregrado. Escuela de Química, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- Wagner, H. 2006. Futuro en la investigación en Fitoterapia: tendencias y retos. *Revista de Fitoterapia*, 6(2): 101-117.
- Willcox, M.; Bodeker, G.; Bourdy, G.; Dhingra, V.; Falquet, J.; Ferreira, J.; Graz, B.; Hirt, H.; Hsu, E.; Magalhães, P.; Provendier, D. y Wright, C. 2004. *Artemisia annua* as a traditional herbal antimalarial. En: Willcox, M.; Bodeker, G. y Rasoanaivo, P. (Eds.), *Traditional Medicinal Plants and Malaria*. CRC Press. Boca Raton. Págs. 43-59.
- Woerdenbag, H.; Pras, N.; Chan, N.; Bang, B.; Bos, R.; Van Uden, W.; Van, Y.; Boi, N.; Batterman, S. y Lugt, C. 1994. Artemisinin, related sesquiterpenes, and essential oil in *Artemisia annua* during a vegetation period in Vietnam. *Planta Medica*, 60: 272-275.
- Wright, C.; Linley, P.; Brun, R.; Wittlin, S. y Hsu, E. 2010. Ancient chinese methods are

remarkably effective for the preparation of artemisinin-rich extracts of qing hao with potent antimalarial activity. *Molecules*, 15: 804-812.

Wright, C. y Warhurst, D. 2002. The mode of action of artemisinin and its derivatives. En: *Artemisia. Medicinal and aromatic plants - Industrial profiles*. Wright, C. (ed). Taylor & Francis. Londres. Págs. 249-288.

Xiao, S.; Chollet, J.; Utzinger, J.; Dong, Y.; Matile, H.; Jinyan, M. y Tanner, M. 2001. Artemether administered together with haemin damages schistosomes *in vitro*. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 95(1): 67-71.

Yang, D. y Liew, F. 1993. Effects of qinghaosu (artemisinin) and its derivatives on experimental cutaneous leishmaniasis. *Parasitology*, 106: 7-11.

APÉNDICES



Figura 1. Bandejas de germinación conteniendo tierra abonada, en la cual se sembraron las semillas de *A. annua*.

Tabla 1. Resumen estadístico del análisis de varianza multifactorial aplicado a la densidad celular de epimastigotes de *T. cruzi* bajo la acción de infusiones de *A. annua*.

Nivel	Contaje	Media	Error estándar	Límite inferior	Límite superior
Gran media	162	0,294814			
INFUSIÓN					
Cumaná	84	0,410335	0,0330727	0,344979	0,47569
Luxemburgo	78	0,179293	0,0346309	0,110858	0,247728
CONCENTRACIÓN (% m/v)					
Control	24	0,912468	0,0618734	0,790198	1,03474
0,40	24	0,653553	0,0618734	0,531283	0,775822
0,60	24	0,453414	0,0618734	0,331144	0,575683
0,80	24	0,2709	0,0618734	0,14863	0,39317
1,00	24	0,145779	0,0618734	0,0235097	0,268049
2,00	22	-0,0746039	0,064873	-0,202801	0,0535933
3,00	20	-0,297813	0,0683309	-0,432844	-0,162783
AISLADO					
RG1	81	0,251924	0,0337703	0,185189	0,318658
CHHP	81	0,337704	0,0337703	0,270969	0,404438
TIEMPO (días)					
0	28	0,30103	0,0572837	0,18783	0,41423
1	28	0,116498	0,0572837	0,00329813	0,229698
2	28	0,204117	0,0572837	0,0909174	0,317317
3	28	0,261698	0,0572837	0,148498	0,374898
4	26	0,319792	0,059678	0,201861	0,437723
7	24	0,565748	0,0623736	0,44249	0,689006

(*) Denota diferencia estadística ($p < 0,05$).

Tabla 2. Prueba de rangos múltiples de Bonferroni para tipo de infusión de *A. annua* que ejercen su acción sobre epimastigotes de *T. cruzi*.

Infusión	Contaje	Media LS	Grupos homogéneos
Luxemburgo	78	0,179293	X
Cumaná	84	0,410335	X
Contraste	Diferencia	+/- Limites	
Cumaná-Luxemburgo	*0,231042	0,0941879	

(*) Denota diferencia estadística ($p < 0,05$).

Tabla 3. Prueba de rangos múltiples de Bonferroni para concentración de las infusiones de *A. annua* que ejercen su acción sobre epimastigotes de *T. cruzi*.

Concentración (% m/v)	Contaje	Media LS	Grupos homogéneos
3,00	20	-0,297813	X
2,00	22	-0,0746039	XX
1,00	24	0,145779	XX
0,80	24	0,2709	XX
0,60	24	0,453414	XX
0,40	24	0,653553	XX
Control	24	0,912468	X
Contraste	Diferencia	+/-	Limites
0 - 0,40	0,258915		0,270506
0 - 0,60	*0,459054		0,270506
0 - 0,80	*0,641567		0,270506
0 - 1,00	*0,766688		0,270506
0 - 2,00	*0,987072		0,276586
0 - 3,00	*1,21028		0,283709
0,40 - 0,60	0,200139		0,270506
0,40 - 0,80	*0,382652		0,270506
0,40 - 1,0	*0,507773		0,270506
0,40 - 2,00	*0,728157		0,276586
0,40 - 3,00	*0,951366		0,283709
0,60 - 0,80	0,182513		0,270506
0,60 - 1,00	*0,307634		0,270506
0,60 - 2,00	*0,528018		0,276586
0,60 - 3,00	*0,751227		0,283709
0,80 - 1,00	0,125121		0,270506
0,80 - 2,00	*0,345504		0,276586
0,80 - 3,00	*0,568714		0,283709

(*) Denota diferencia estadística ($p < 0,05$).

Tabla 4. Prueba de rangos múltiples de Bonferroni para aislado de *T. cruzi* bajo acción de las infusiones de *A. annua*.

Aislado	Contaje	Media LS	Grupos homogéneos
RG1	81	0,251924	X
CHHP	81	0,337704	X
Contraste	Diferencia	+/- Limites	
RG1-CHHP	-0,08578	0,0941233	

(*) Denota diferencia estadística ($p < 0,05$).

Tabla 5. Prueba de rangos múltiples de Bonferroni para tiempo de exposición de los epimastigotes de *T. cruzi* bajo acción de las infusiones de *A. annua*.

Tiempo (días)	Contaje	Media LS	Grupos homogéneos
1	28	0,116498	X
2	28	0,204117	X
3	28	0,261698	X
0	28	0,30103	X
4	28	0,319792	XX
7	28	0,565748	X
Contraste	Diferencia	+/- Límites	
0 - 1	0,184532	0,241706	
0 - 2	0,0969129	0,241706	
0 - 3	0,0393322	0,241706	
0 - 4	-0,018762	0,24631	
0 - 7	*-0,264718	0,251575	
1 - 2	-0,0876192	0,241706	
1 - 3	-0,1452	0,241706	
1 - 4	-0,203294	0,24631	
1 - 7	*-0,44925	0,251575	
2 - 3	-0,0575806	0,241706	
2 - 4	-0,115675	0,24631	
2 - 7	*-0,361631	0,251575	
3 - 4	-0,0580942	0,24631	
3 - 7	*-0,30405	0,251575	
4 - 7	-0,245956	0,256002	

(*) Denota diferencia estadística ($p < 0,05$).

HOJAS DE METADATOS

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 1/6

Título	Caracterización de <i>Artemisia annua</i> cultivada bajo condiciones ambientales típicas del noreste venezolano y evaluación de su acción sobre epimastigotes de <i>Trypanosoma cruzi</i>
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor(es)

Apellidos y Nombres	Código CVLAC / e-mail	
Cariaco S., Yusmaris J.	CVLAC	18.905.744
	e-mail	yusmaris_c@hotmail.com
	e-mail	

Palabras o frases claves:

<i>Artemisia annua</i>
Infusiones
<i>Trypanosoma cruzi</i>
<i>In vitro</i>

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 2/6

Líneas y sublíneas de investigación:

Área	Subárea
Ciencias	Departamento de Bioanálisis

Resumen (abstract):

En esta investigación se caracterizaron semillas de *Artemisia annua* enviadas desde Luxemburgo, y las plantas que resultaron de su siembra en Cumaná; así mismo, se evaluó la acción de esta planta sobre epimastigotes de *Trypanosoma cruzi* usando dos tipos de infusiones: una preparada con hojas de plantas cultivadas en Cumaná y otra con hojas provenientes de Luxemburgo, ambas a concentraciones de 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00; 3,00% m/v de *A. annua*; sobre dos aislados de *T. cruzi*: RG1 y CHHP, durante 7 días, en cada uno de los cuales se determinó la densidad celular de los parásitos. Las semillas de *A. annua* recibidas poseían un porcentaje de humedad de $9,68 \pm 1,06\%$, germinación *in vitro* de $3,66 \pm 1,53\%$, masa promedio de cada semilla de $42,50 \pm 1,90 \mu\text{g}$ y longitud promedio de $0,84 \pm 0,13 \text{ mm}$; al sembrar en arena su desarrollo fue escaso y la producción de primordios florales prematura (a los 34 días), además no soportaron el proceso de trasplante; en cambio, en tierra abonada se logró un mejor desarrollo; sin embargo, produjeron botones florales a los 28 días posteriores a la siembra. Las plantas bajo estudio tuvieron una altura máxima de 45,00 cm, presentaron hojas primero dentadas, luego bipinatisectas y finalmente tripinatisectas de hasta 13,00 cm de longitud, tallos de hasta 5,00 mm de diámetro, los cuales en la fase temprana de crecimiento son lisos y en la ramificación estriados, e inflorescencias plurifloras, cuyos capítulos presentaron 4,00 mm de altura y 6,00 mm de diámetro aproximadamente. Se encontró que las infusiones de *A. annua* tuvieron un efecto antiproliferativo, dosis dependiente sobre ambos aislados de *T. cruzi*, resultando ser más potente la acción de la infusión preparada con hojas provenientes de Luxemburgo, que la que fue preparada con hojas de plantas cultivadas en Cumaná. Ampliando y profundizando los estudios acerca del tema, éstas infusiones de *A. annua* podría convertirse en una nueva alternativa terapéutica contra la infección contra *T. cruzi*.

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 3/6

Contribuidores:

Apellidos y Nombres	ROL / Código CVLAC / e-mail	
Mariolga Berrizbeitia	ROL	C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/>
	CVLAC	6.119.292
	e-mail	mberriz@yahoo.com
	e-mail	
José Imery	ROL	C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/>
	CVLAC	8.650.956
	e-mail	jimeryb@cantv.net
	e-mail	
Zulay Simoni	ROL	C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> JU <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/>
	CVLAC	13.773.647
	e-mail	zulay.simoni@gmail.com
	e-mail	
José Veliz	ROL	C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> JU <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/>
	CVLAC	7.711.312
	e-mail	jveliz@gmail.com
	e-mail	

Fecha de discusión y aprobación:

Año Mes Día

Colocar fecha de discusión y aprobación:

2013	10	31
-------------	-----------	-----------

Lenguaje: SPA

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/6

Archivo(s):

Nombre de archivo	Tipo MIME
Tesis-cariacoy.doc	Application/word

Alcance:

Espacial: _____ Internacional _____

Temporal: _____ Temporal _____

Título o Grado asociado con el trabajo: Licenciada en Bioanálisis

Nivel Asociado con el Trabajo: Licenciada

Área de Estudio: Bioanálisis

Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado: Universidad de Oriente

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 5/6



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
CONSEJO UNIVERSITARIO
RECTORADO

CUN°0975

Cumaná, 04 AGO 2009

Ciudadano
Prof. JESÚS MARTÍNEZ YÉPEZ
Vicerrector Académico
Universidad de Oriente
Su Despacho

Estimado Profesor Martínez:

Cumplo en notificarle que el Consejo Universitario, en Reunión Ordinaria celebrada en Centro de Convenciones de Cantaura, los días 28 y 29 de julio de 2009, conoció el punto de agenda **"SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TODA LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UDO, SEGÚN VRAC N° 696/2009"**.

Letido el oficio SIBI – 139/2009 de fecha 09-07-2009, suscrita por el Dr. Abul K. Bashirullah, Director de Bibliotecas, este Cuerpo Colegiado decidió, por unanimidad, autorizar la publicación de toda la producción intelectual de la Universidad de Oriente en el Repositorio en cuestión.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
SISTEMA DE BIBLIOTECA
RECIBIDO POR *[Firma]*
FECHA 5/8/09 HORA 5:30

Comunicación que hago a usted a los fines consiguientes.

Cordialmente,

[Firma]
JUAN A. BOLANOS CUNPEL
Secretario




C.C: Rectora, Vicerrectora Administrativa, Decanos de los Núcleos, Coordinador General de Administración, Director de Personal, Dirección de Finanzas, Dirección de Presupuesto, Contraloría Interna, Consultoría Jurídica, Director de Bibliotecas, Dirección de Publicaciones, Dirección de Computación, Coordinación de Teleinformática, Coordinación General de Postgrado.


JABC/YGC/maruja

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso- 6/6


Artículo 41 del REGLAMENTO DE TRABAJO DE PREGRADO (vigente a partir del II Semestre 2009, según comunicación CU-034-2009) : “los Trabajos de Grado son de la exclusiva propiedad de la Universidad de Oriente, y sólo podrán ser utilizados para otros fines con el consentimiento del Consejo de Núcleo respectivo, quien deberá participarlo previamente al Consejo Universitario para su autorización”.




Autor
Yusmaris Cariaco



Asesora
Mariolga Berrizbeitia



Coasesor
José Imery



Jurado
Zulay Simoni



Jurado
José Veliz

POR LA COMISION DE TESIS:



